

# មេរៀនដំណាំនសោនាស



## វិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសនៃការដាំនសោនាស

### ក) ការរៀបចំដី

១- ក្តួររាស់និងហាលដីរយៈពេល ១ថ្ងៃទៅ១៥ថ្ងៃ

២- ក្តួរដី២ឬ៣ដងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យស្មៅងាប់ សម្លាប់សត្វស្អិត ចង្រៃ និងធ្វើឱ្យដីធូរមានអុកស៊ីសែនផងដែរ។

### ខ) ការរៀបចំរងនិងរណ្តៅដាំ

១- យើងអាចលើករង ១ទីងប្រវែងពី៥០ទៅ៦០សង់ទីម៉ែត្រ(៥-៦តីក) បណ្តោយរងយោងទៅតាមទំហំដី រីឯ កំពស់យកប្រវែងពី១០ទៅ១៥សង់ទីម៉ែត្រ(១តីកទៅ១តីកន្លះ) នៅក្នុង រដូវប្រាំង ចំណែកឯនៅក្នុង រដូវវស្សា យកប្រវែងពី ១៥ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ(១តីកកន្លះទៅ២តីក)។ បន្ទាប់ពីនោះកាប់ចង្កូរតាមបណ្តោយរង។

២- ដីករណ្តៅក្នុងជម្រៅពី ២០ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ(២-៣តីក) រីឯជ្រុងរណ្តៅនីមួយៗយកប្រវែងពី ២ទៅ៣តីក ហើយចន្លោះពីររណ្តៅ ១ទៅរណ្តៅ១ យកប្រវែង ១ម៉ែត្រទៅ២ម៉ែត្រ។

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៣-ដាក់ជីធម្មជាតិច្របល់ជាមួយដីដែលនៅបាតរណ្តៅ បន្ទាប់មក  
លុបដីទៅក្នុងរណ្តៅឱ្យមានផ្ទៃរាបស្មើ។

**គ) ការដាំដុះននោងនាល**

- ១-យកគ្រាប់ពូជមកត្រាំទឹករយៈពេល១យប់បន្ទាប់មកផ្តាច់១យប់ទៀត
- ២-ដាក់គ្រាប់ពូជននោងនាលចំនួន៣គ្រាប់សម្រាប់១រណ្តៅ ហើយ  
កប់វាក្នុងជម្រៅ១ថ្នាំងដៃ។
- ៣-បន្ទាប់ពីដាំរួច ត្រូវស្រោចទឹកវាឱ្យជោគ។

**ឃ) ការធ្វើច្រើង**

នៅពេលននោងលូតលាស់បានបន្តិច យើងត្រូវធ្វើច្រើងឱ្យវាវារឡើង  
ដោយយកទទឹងប្រវែង២ទៅ៣ម៉ែត្រ បណ្តោយទៅតាមលទ្ធភាព រីឯកំពស់  
យកប្រវែង១ម៉ែត្រកន្លះ។

**ង) ការថែទាំននោងនាល**

- ១-ដកស្មៅ
- ២-ជ្រុំជើង
- ៣-ដាក់ជីធម្មជាតិ
- ៤-ស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច
- ៥-ឃ្នាំមើលសត្វល្អិត។

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

**ច) ការប្រមូលផល**

នៅពេលនោះមាន **អាយុ ៤០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ** យើងអាចប្រមូលផលបាន។



---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

# មេរៀនដំណាំដីតាំងអោ



## វិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសនៃការដាំដីតាំងអោ

### ក) ការរៀបចំដី

១- ភ្ជួររាស់និងហាលដើរយះពេល ១ថ្ងៃទៅ១៥ថ្ងៃ

២- ភ្ជួរដី២ឬ៣ដងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យស្មៅងាប់ សម្លាប់សត្វស្អិត ចង្រៃ និងធ្វើឱ្យដីធូរមានអុកស៊ីសែនជងដែរ។

### ខ) ការរៀបចំរង

១- យើងអាចលើករង ១ទីងប្រវែង១ម៉ែត្រ បណ្តោយយោងទៅតាម ទំហំដី រីឯកំពស់យកប្រវែងពី ១០ទៅ១៥សង់ទីម៉ែត្រ (១តឹកទៅ១តឹកនួន) នៅក្នុង រដូវប្រាំង ចំណែកឯនៅក្នុង រដូវវស្សា យកប្រវែងពី ២០ទៅ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ (២ទៅ៣តឹក)។

២- ប្រើដីធម្មជាតិសម្រាប់ដាក់នៅបាតរង។

### គ) ការដាំតាំងអោ

១- យកគ្រាប់ពូជមកត្រាំទឹករយៈពេល១យប់បន្ទាប់មកផ្កាប់១យប់ទៀត

២- យកដីខ្សាច់៤ភាគ លាយជាមួយគ្រាប់តាំងអោ បន្ទាប់មកយកគ្រាប់ សាបឱ្យស្មើដៃនៅក្នុងរង។

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៣-យកកំទេចចំបើងគ្របលើរងដើម្បីការពារគ្រាប់ឃ្នាតចេញក្រៅ។

៤-ធ្វើដំបូលគ្របលើរង(គ្រាប់មិនទាន់ដុះនៅឡើយ) ប្រសិនបើអាច ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រាប់តាំអាចចេញពន្លកត្រូវដកដំបូលចេញ។

**យ) ការថែទាំ**

១-នៅពេលកូនតាំអាមាន **អាយុពី ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ** ត្រូវដកស្មៅជ្រុំជើង។

២-ប្រើទឹកអ៊ីអិមពី **២០ ទៅ ៣០ សេសេ** លាយជាមួយ **ទឹក ១៥ លីត្រ** ហើយកូរវាផងមុនពេលបាញ់ទៅលើដំណាំ។

៣-ឃ្នាំមើលសត្វល្អិតចង្រៃជាប្រចាំ។

៤-ស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។

**ង) ការប្រមូលផល**

នៅពេលដំណាំតាំអាមាន **អាយុ ៣០ ថ្ងៃ ទៅ ៣៥ ថ្ងៃ** យើងអាចប្រមូល ផលបាន។



---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)