

# មេរៀនដំណាំបន្លែឌីឡីក



## បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំបន្លែឌីឡីក

១. ជាដំបូងត្រូវជ្រើសរើសដីទួលសម្រាប់ដាំដំណាំបន្លែឌីឡីក
២. កាប់គាស់ក្នុងរាស់និងហាលដីឱ្យបាន១សប្តាហ៍ឬលើស១សប្តាហ៍
៣. កាប់ចង្កូរសម្រាប់ដាំឌីឡីកដោយយកជម្រៅ១តីកកន្លះនិងទទឹងមាត់ចង្កូរ២តីកកន្លះ។
៤. គម្លាតពីជួរមួយទៅជួរមួយយកប្រវែង១ម៉ែត្រ រីឯបណ្តោយវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពដីដែលមាន។
៥. ដាក់ដីធម្មជាតិតាមចង្កូរក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េប្រើដី៥គីឡូក្រាម
៦. យកគ្រាប់ពូជមកស្រុះ ទឹកក្តៅឧណ្ហៗរយៈពេល១០នាទីបន្ទាប់មកត្រាំទឹកត្រជាក់រយៈពេល៥ម៉ោងនិងដាក់ផ្តាប់បន្តទុកក្នុងទឹកកករយៈពេល៦ម៉ោងទៀត បន្ទាប់ពីនោះយើងអាចយកគ្រាប់ពូជមកដាំបាន។ ក្នុង១រណ្តៅយើងប្រើពូជ៣គ្រាប់។
៧. សូមបញ្ជាក់៖ ការដាំគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយកប្រវែង១ម៉ែត្រ។
៨. ការដាំឌីឡីកប្រើរយៈពេល១ខែកន្លះទើបអាចផ្តល់ផល។

---

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង  
 លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៩. ចំណុចសំខាន់គឺតាមដាន ថែទាំ ស្រោចទឹក ដកស្មៅ និងកំចាត់សត្វល្អិត។ល។



---

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង  
លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

# បេក្ខន៍ដំណាំត្រសក់ចំណារ



ត្រសក់ចំណារគឺជាដំណាំដែលគេនិយមដាំ និងនិយមបរិភោគផ្លែ ខ្លី។ វាជាប្រភពដែលសម្បូរវីតាមីន និងសម្បូរសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗជាច្រើនដូច ជា ទឹក ប្រូតេអ៊ីន ប្រេងខ្លាញ់ ថាមពលជាតិដែក និងវីតាមីនសេជាដើម។

## ១. បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំត្រសក់ចំណារ

### ១.១. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាសំខាន់ដំបូងសំរាប់ការដាំដុះកំណត់ទិន្ន ផល និងតម្រូវការទីផ្សារ។

កត្តាសំខាន់ៗដែលត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសពូជមានដូចខាងក្រោម៖

- ❖ ពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់ (ពូជក្នុងស្រុកឬពូជបង្កាត់)
- ❖ ពូជមានអាយុកាលត្រឹមត្រូវ
- ❖ ពូជដែលមានដំណុះល្អ៨៥-៩០%
- ❖ ពូជសុទ្ធល្អ

---

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

❖ ពូជធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងសត្វល្អិត និងធន់នឹងជំងឺ។

ចំពោះពូជបង្កាត់មិនអាចទុកពូជសម្រាប់ដាំបន្តបានទេ។

### ១.២. ការរៀបចំដី

- 📖 ការភ្ជួរដីនិងរាស់ដីឲ្យបាន២ទៅ៣ដង
- 📖 ហាលដីឲ្យស្ងួតល្អរយៈពេលពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ
- 📖 វាយដីឲ្យម៉ដ្ឋនិងសំអាតស្មៅចេញឲ្យបានស្អាត។

### ១.៣. ការលើករង

➢ យើងអាចលើករងកំពស់ពី១៥ទៅ២៥ស.ម នៅរដូវប្រាំង នៅរដូវវស្សា កំពស់រងពី២៥ទៅ៣០ស.ម និងទទឹងរង១០០ស.ម រីឯបណ្តោយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។

➢ ដាក់ដីធម្មជាតិពី៥ទៅ៦គីឡូក្រាមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ ច្របល់ជាមួយដី រួចរាស់លុបឲ្យបានស្មើល្អ។

### ១.៤. របៀបបំប៉ន

#### ក. ការបំប៉នច្រាបច្រាស់

➢ ក្រោយពីលើករងរួចគេដឹករណ្តៅជម្រៅពី ២០ទៅ៣០ស.ម

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង  
 លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ក្នុង១រណ្តៅត្រូវដាក់ដីកំប៉ុស្ត៍០.៥-១គ.ក្រ
- ហាលគ្រាប់ពូជរយៈពេល១ម៉ោងបន្ទាប់មកលាងទឹកសំអាតឲ្យស្អាតរួចត្រាំទឹករយៈពេលពី៤ទៅ៥ម៉ោង ហើយរុំគ្រាប់ពូជជាមួយនឹងក្រណាត់រួចហើយកប់ដីសើមរយៈពេលមួយយប់។
- អត្រាគ្រាប់ត្រសក់ដាំពី១ទៅ២គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅ រួចយកកំណាត់ចំបើងខ្លីៗឬដីធម្មជាតិពុកផុយរលួយល្មមករោយគ្របពីលើរណ្តៅ រួចហើយស្រោចទឹកភ្លាមដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជឆាប់ដុះលូតលាស់រហ័ស។
- គំលាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយកពី៣ទៅ៥តីករាងជាអក្សរវី(V) ចន្លោះជួរដើរយក៥តីក និងទ្រូងដំណាំយក៤ទៅ៥តីក។

**ខ. ការបណ្តុះបណ្តាល**

- ជាដំបូងគេត្រូវលាយល្បាយដីសំរាប់បណ្តុះគ្រាប់ពូជដោយប្រចល់ដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋដែលបានសំលាប់មេរោគរួចចំនួន៥០% (យកដីខ្សាច់មកគ្របដោយកៅស៊ូប្លាស្ទិកដោយដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល២ទៅ៣ថ្ងៃ)និងដីល្បាយដែលមានដីជាតិចំនួន៥០% រួចច្របល់ឲ្យសព្វល្អ ហើយច្រកចូលក្នុងថង់ប្លាស្ទិក កន្លែង ឬថ្នាល។
- ត្រូវចោះបាតថង់ប្លាស្ទិកឬកន្លែងនោះ ដើម្បីឲ្យជ្រាបទឹកចេញបានល្អ រួចយកគ្រាប់សាបតែម្តង។

---

រៀបចំដោយ លោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### **គ. ការវាយតម្លៃ**

- របៀបដាំដូចទៅនឹងរបៀបដាំគ្រាប់ផ្ទាល់ខាងលើដែរ
- គេអាចដាំកូនត្រសក់នៅពេលដែលវាមានស្លឹក២ឬ៣សន្លឹក
- ត្រូវដាំនៅពេលល្ងាចត្រជាក់ល្អ
- បន្ទាប់ពីដាំហើយត្រូវយកកំទេចចំបើងស្នូតៗមករោយលើគល់

ដើម្បីរក្សាសំណើម។

### **២. ការថែទាំ**

#### **២.១. ការជ្រោយដី ពូនគល់ និងការកំចាត់ស្មៅ**

ជម្រុះស្មៅ ជ្រោយដី ពូនគល់ និងដករំលោះកូនមុនដាក់ដីបំប៉ន។ ត្រូវស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចជាប្រចាំរហូតដល់ពេលឈប់ប្រមូលផល។

#### **២.២. ការថែទាំ**

ប្រើដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតដោយក្នុងមួយរណ្តៅប្រើដីពី០.៥ គីឡូក្រាម ទៅ១គីឡូក្រាម។

#### **២.៣. ការស្រោចស្រប់**

---

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ត្រូវស្រោចទឹកជាប្រចាំនៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច
- ត្រូវរក្សាសំណើមពី ៦០ទៅ៧០% ប្រសិនបើមានសំណើមខ្ពស់ ពេកអាចកើតឡើងនូវពពួកជម្ងឺក្នុងដី។

### ២.៤. ការវាត់ចំណារ

❖ នៅពេលកូនត្រសក់ចាប់ផ្តើមបោះទង ក្រោយដាំរយៈពេលពី១០ ទៅ១៥ថ្ងៃយើងចាប់ផ្តើមធ្វើចំណារដោយយកមែកឈើរូបកូនឬស្បៀមកដោតរួច ចងផ្គុំគ្នាតាមបណ្តោយរងដែលមានកំពស់ពី១.៥ទៅ២ម៉ែត្រ។

❖ ពេលត្រសក់បែកខ្លែងក្រោយដាំបាន២០ទៅ២៥ថ្ងៃ យើងត្រូវ ត្រួតពិនិត្យ និងដាក់ចំណារឲ្យត្រសក់ឡើងឱ្យបានល្អ។

### ៣. ការប្រមូលផលនិងការទុកវាត់គ្រាប់ពូជ

#### ៣.១. ការប្រមូលផល

យើងអាចប្រមូលផលផ្លែត្រសក់ក្រោយពេលដាំដុះឬមានអាយុដូច ខាងក្រោម៖

- ✓ ពូជស្រាលអាយុ៣៥ទៅ៤០ថ្ងៃ
- ✓ ពូជកណ្តាលអាយុ ៤០ទៅ៥០ថ្ងៃ

---

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ✓ ពូជធ្ងន់អាយុ ៥០ទៅ៦០ថ្ងៃ
- ✓ ការប្រមូលផលត្រសក់បើយឺតយ៉ាវបណ្តាលឲ្យផ្លែត្រសក់ចាស់ គ្មានតម្លៃនៅលើទីផ្សារ។

### ៣.២. ការទុកដាក់គ្រាប់ពូជ

ត្រូវជ្រើសរើសផ្លែត្រសក់ណាដែលធំ ទំលុ គ្មានជម្ងឺនិងគ្មានសត្វ ល្អិតបំផ្លាញ។ ក្រោយពីបេះវារួចត្រូវយកវាទុករយៈពេលពី៣ទៅ៥ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់បេះចេញពីសាច់ ទើបពុះច្របាច់លាងទឹកឲ្យស្អាត និង ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតល្អ រួចច្រកពូជក្នុងដបឬកែវ(ទុក១ភាគ៣នៃដប)គ្របឲ្យ ជិតទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព កន្លែងត្រជាក់និងមានខ្យល់ចេញ ចូលគ្រប់គ្រាន់។




---

រៀបចំដោយ លោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)