

បញ្ជីនាមបង្កើតបង្ក្រប់ស្រុក



បញ្ជីនាមបង្កើតបង្ក្រប់ស្រុក

១. ការជ្រើសរើសពូជប្រូម៉ូប៉ូ

ការជ្រើសរើសពូជត្រូវដឹងអំពីតម្រូវការទីផ្សារឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាមុនសិន។

សារធាតុសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងបង្កើតបង្ក្រប់ ១០០ក្រាមមាន៖

- ថាមពល ៣៩កាឡូរី
- ប្រូតេអ៊ីន ១,៦ក្រាម
- ខ្លាញ់ ០,៥ក្រាម
- កាបូអ៊ីដ្រាត ៧,១ក្រាម
- កាល់ស្យូម ៧មីលីក្រាម
- ផូស្វ័រ ១០មីលីក្រាម
- ជាតិដែក ០,៨មីលីក្រាម
- ទឹក ៩០ក្រាម
- វីតាមីនសេ ២៥ក្រាម និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។

រៀបចំដោយ លោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

២. ការរៀបចំ

- ☒ ត្រូវកាប់ឬកូរដីនិងហាលដីទុករយៈពេល២សប្តាហ៍
- ☒ ត្រូវកូរឬប្រើដីឡើងវិញឱ្យបាន ២ទៅ៣ដងទៀត។

៣. ការធ្វើរង

- ☺ ការដាំជា២ជួរ គេធ្វើរងទទឹងប្រវែងពី១ទៅ១,២ម៉ែត្រ រីឯបណ្តោយតាមលទ្ធភាពដី។
- ☺ ការដាំ១ជួរគេធ្វើរងទទឹងប្រវែង៥តីករីឯបណ្តោយតាមលទ្ធភាពដី។
- ☺ គេលើកកំពស់រងប្រវែង ២តីកនៅរដូវប្រាំង ហើយនៅរដូវវស្សាកំពស់រង ៣តីក។
- ☺ គម្លាតពីរងមួយទៅរងមួយទៀតគឺ ប្រវែង៥តីកសម្រាប់ផ្លូវដើរ។

៤. ការហែចុះ

- ❖ គេដឹករណ្តៅទំហំ២តីកបួនជ្រុង រួចដាក់ដីធម្មជាតិឬដីកំប៉ុស្តិ៍ចំនួន២ត្រច្នោក ហើយច្របល់ជាមួយដីដែលនៅក្នុងរណ្តៅសម្រាប់ទ្រាប់បាតរណ្តៅ។
- ❖ យកគ្រាប់ត្រប់ទៅហាលថ្ងៃរយៈពេល១ម៉ោងទៅ២ម៉ោងឬស្រុសជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗរយៈពេល១៥នាទី រួចយកវាទៅត្រាំជាមួយទឹក

រៀបចំដោយ លោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

ត្រជាក់រយៈពេលពី៣ទៅ៤ម៉ោង បន្ទាប់មកផ្តាច់វាទុករយៈពេល១យប់ ទើបយកវាទៅព្រោះឬបណ្តុះ។

- ❖ បើសាបលើថ្នាលត្រូវធ្វើថ្នាលឱ្យបានស្អាតល្អជាមុនសិន មុននឹង យកគ្រាប់គ្រប់ទៅសាបឬបណ្តុះក្នុងកន្លែង ត្រូវធ្វើដីទុកឱ្យហើយ។
- ❖ ពេលកូនគ្រប់អាយុបាន២០ទៅ២៥ថ្ងៃ អាចដកស្នូងបាន ឬកូន គ្រប់មានសន្លឹក៣ទៅ៤សន្លឹកអាចដាំបាន។
- ❖ គម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយកប្រវែងពី៧ទៅ៨តឹក។
- ❖ បើដាំជា២ជួរ គេដាំជាអក្សរវីឬត្រីកោណ
- ❖ ទ្រូងកណ្តាលត្រូវទុកគម្លាត៥តឹក

៥. ការថែទាំ

- ✓ ស្រោចទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- ✓ ជ្រុំជើង បោចស្មៅ ឱ្យបានស្អាត
- ✓ ដាក់ដីបំប៉នផងដែរ។

៦. ការប្រមូលផល

- ពេលគ្រប់អាយុប្រហែល៤៥ទៅ៥០ថ្ងៃក្រោយពីស្នូងរួច ឬពី៧០ ទៅ៨០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃសាបគ្រាប់ឬបណ្តុះកូន គឺអាចប្រមូលផលបាន។
- គ្រប់ដែលមានផ្លែច្រើនគឺមានអាយុចាប់ពី១៤០ថ្ងៃឡើងទៅ។

រៀបចំដោយ លោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ការប្រមូលផលបន្ថែមត្រូវត្រូវសិក្សាពីទីផ្សារឱ្យបានច្បាស់លាស់ ផងដែរ។



បេក្ខន៍ដំណាំស្បែកក្រញ៉ាញ



បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំស្បែកក្រញ៉ាញ

១. ការរៀបចំដី

- 📖 ត្រូវភ្ជួរដីហាលទុករយៈពេលពី ១០ ទៅ ២០ ថ្ងៃ
- 📖 រួចត្រូវភ្ជួរប្រេដឡើងវិញឱ្យបានច្រើនសារ (ពីរទៅបីដង)។

២. ការរៀបចំរង ឬ ថ្នាល

❖ ការធ្វើរងត្រូវគិតទៅតាមរដូវកាល នៅរដូវប្រាំងកំពស់រងចាប់ពី ១៥ ទៅ ២០ សង់ទីម៉ែត្រ នៅរដូវវស្សាកំពស់រងចាប់ពី ២០ ទៅ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ រីឯទទឹងរងយកប្រវែងពី ១ ម៉ែត្រ ទៅ ១,២ ម៉ែត្រ ចំណែកបណ្តោយយកតាមស្ថានភាពដី។

❖ ត្រូវដាក់ជីធម្មជាតិឬជាតិកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតពី ១០ ទៅ ១៥ គីឡូក្រាមសម្រាប់រងប្រវែងពី ៣ ទៅ ៥ ម៉ែត្រ រួចច្របល់ជាមួយដីរងនោះ។

រៀបចំដោយ លោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៣. ការវាយប៉ះ

ក. ការសាបគ្រាប់ពូជផ្ទាល់

☐ ត្រូវយកគ្រាប់ពូជហាលថ្ងៃរយៈពេលពី២០ទៅ៣០នាទី បន្ទាប់មកយកវាទៅត្រាំទឹករយៈពេល៣ម៉ោង រួចផ្តាច់វា១យប់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាឆាប់រីកពន្លកបណ្តាល។

☐ ត្រូវយកគ្រាប់ពូជនោះលាយច្របល់ជាមួយដីខ្សាច់៤ភាគដោយធ្វើឱ្យស្មើសាច់ រួចយកវាទៅព្រោះលើរងឱ្យបានស្មើដៃល្អ។

☐ ដីរងត្រូវធ្វើឱ្យម៉ដ្ឋល្អ បន្ទាប់ពីព្រោះរួចត្រូវស្រោចទឹកភ្លាមដើម្បីការពារសត្វល្អិតមកជញ្ជូនគ្រាប់ចេញ។

ខ. ការដកកូនស្លែង

☐ ការដកកូនដើម្បីយកទៅស្ទង់ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលកូនស្លែងអាយុបានចាប់ពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃឬនៅពេលកូនស្លែងដុះសន្លឹកបាន៣ទៅ៤សន្លឹក។

☐ ត្រូវផ្អាកស្រោចទឹករយៈពេលពី១ទៅ២ថ្ងៃមុនពេលដកកូនស្លែង។

☐ ត្រូវដកកូនស្លែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្រោចទឹករួច

☐ ត្រូវដកកូនស្លែងណាដែលថ្លោសៗល្អនិងមានទំហំប៉ុនគ្នា

☐ ស្ទង់ចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយត្រូវទុកគម្លាតពីគ្នា១៥ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ។

រៀបចំដោយ លោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារីឌីណាស់ (CRDNASE)

☑ ក្រោយពីស្ទង់រួច ត្រូវគ្របកូនសន្ទូងរយៈពេល៣ថ្ងៃបើមានលទ្ធភាព បន្ទាប់មកចាំបើកដំបូលវាចេញ។

មួយបែបទៀតត្រង់ចំនុច«ក»៖ ពេលសាបគ្រាប់រួចត្រូវរោយចំបើងពីលើ ហើយស្រោចទឹកឱ្យជោគ ពេលកូនស្តែងល្អមតេអាចដករំលោះឬដកពី កន្លែងដុះញឹកទៅស្ទង់ត្រង់កន្លែងរង្វើលៗ។

៤. ការថែទាំ

- ✓ ត្រូវស្រោចទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ពេលព្រឹក ពេលល្ងាច ឬថ្ងៃត្រង់
- ✓ ស្ទង់រួចបានរយៈពេលពី៧ទៅ១០ថ្ងៃ ត្រូវជ្រុំជើងឬជ្រោយដី និង បោចស្មៅឱ្យបានស្អាត។
- ✓ ប្រើដីកំប៉ុស្តិ៍ឬជាតិធម្មជាតិសម្រាប់ជំនួយបំប៉ន។

៥. ការប្រមូលផល

- ស្តែងអាចប្រមូលផលបានចាប់ពីអាយុ២៥ទៅ៣០ថ្ងៃ (សាបផ្ទាល់) ស្តែងអាយុ៣០ទៅ៣៥ថ្ងៃគឺស្តែងដកកូនស្ទង់។
- យើងត្រូវមើលទៅលើតម្រូវការនៃទីផ្សារផងដែរ។

