

បេក្ខន៍ដំណាំតាំងអោ



បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំតាំងអោ

១. ការរៀបចំដី

- ❖ ត្រូវភ្ជួរដីហើយហាលវាទុករយៈពេលពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
- ❖ បន្ទាប់មកត្រូវភ្ជួរដីសារឡើងវិញឱ្យបានពី២ទៅ៣ដងក្នុងជម្រៅ២០ ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ។

២. ការរៀបចំថ្នាំលប្បូរ

- ☺ យើងត្រូវធ្វើរងទទឹងប្រវែង១ម៉ែត្រទៅ១.២ម៉ែត្រ រីឯបណ្តោយយក ប្រវែង២០ម៉ែត្រឬតាមលទ្ធភាពដីដែលមាន។
- ☺ ធ្វើកំពស់រងពី១០ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រនៅរដូវប្រាំង ពី២០ទៅ៣០ សង់ទីម៉ែត្រនៅរដូវវស្សា។
- ☺ ត្រូវប្រើជីធម្មជាតិឬជីកំប៉ុស្តិ៍២០បង្កី។

រៀបចំដោយ លោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៣. ការវាយប្រហារ

- ☺ ត្រូវធ្វើថ្នាលនិងដីឱ្យបានស្អាតល្អឱ្យរួចជាស្រេច។
- ☺ យកគ្រាប់ពូជមកហាលថ្ងៃរយៈពេល២ម៉ោង បន្ទាប់មកយកវាទៅត្រាំទឹករយៈពេលពី៤ទៅ៥ម៉ោងរួចផ្តាច់ទុក១យប់ក្នុងធុងទឹកកក ឬខ្ទប់នឹងក្រណាត់រួចកប់ដីរយៈពេល១យប់។
- ☺ យកដីខ្សាច់៤ភាគមកលាយច្របល់ជាមួយនឹងគ្រាប់ពូជ បន្ទាប់មកយកវាទៅព្រោះលើរងឱ្យបានស្តើងល្អម។
- ☺ នៅពេលកូនស្តែតាំងអោយបាន១០ថ្ងៃ យើងអាចដកវាយកទៅស្ទង់បាន។
- ☺ ត្រូវដកកូនណាដែលមានសុខភាពល្អ ថ្លោសៗ ធំប៉ុនៗគ្នា។
- ☺ មុនពេលដកកូន ត្រូវផ្អាកស្រោចទឹករយៈពេល១ថ្ងៃ។
- ☺ ត្រូវដកកូនតាំងអោយភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីស្រោចទឹករួច។

៤. ការថែទាំ

- យើងត្រូវជ្រុំជើងស្តែតាំងអោ
- យើងត្រូវបោចស្មៅនិងមើលសត្វល្អិត
- ស្រោចទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

៥. ការប្រមូលផល

យើងអាចប្រមូលផលស្តែតាំងអោបាននៅពេលវាមានអាយុ៣៥ថ្ងៃ។



រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

បេឡេនដំណាំត្រសក់ចំណារ



ត្រសក់ចំណារគឺជាដំណាំដែលគេនិយមដាំ និងនិយមបរិភោគផ្លែ ខ្លីៗ វាជាប្រភពដែលសម្បូរវីតាមីន និងសម្បូរសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗជាច្រើនដូច ជា ទឹក ប្រូតេអ៊ីន ប្រេងខ្លាញ់ ថាមពលជាតិដែក និងវីតាមីនសេជាដើម។

១. បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំត្រសក់ចំណារ

១.១. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាសំខាន់ដំបូងសំរាប់ការដាំដុះកំណត់ទិន្ន ផល និងតម្រូវការទីផ្សារ។

កត្តាសំខាន់ៗដែលត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសពូជមានដូចខាងក្រោម៖

- ❖ ពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់ (ពូជក្នុងស្រុកឬពូជបង្កាត់)
- ❖ ពូជមានអាយុកាលត្រឹមត្រូវ
- ❖ ពូជដែលមានដំណុះល្អ៨៥-៩០%
- ❖ ពូជសុទ្ធល្អ

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

❖ ពូជធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងសត្វល្អិត និងធន់នឹងជំងឺ។

ចំពោះពូជបង្កាត់មិនអាចទុកពូជសម្រាប់ដាំបន្តបានទេ។

១.២. ការរៀបចំដី

- 📖 ការភ្ជួរដីនិងរាស់ដីឲ្យបាន២ទៅ៣ដង
- 📖 ហាលដីឲ្យស្ងួតល្អរយៈពេលពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ
- 📖 វាយដីឲ្យម៉ដ្ឋនិងសំអាតស្មៅចេញឲ្យបានស្អាត។

១.៣. ការលើករង

➢ យើងអាចលើករងកំពស់ពី១៥ទៅ២៥ស.ម នៅរដូវប្រាំង នៅរដូវវស្សា កំពស់រងពី២៥ទៅ៣០ស.ម និងទទឹងរង១០០ស.ម រីឯបណ្តោយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។

➢ ដាក់ដីធម្មជាតិពី៥ទៅ៦គីឡូក្រាមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ ច្របល់ជាមួយដី រួចរាស់លុបឲ្យបានស្មើល្អ។

១.៤. របៀបបំប៉ន

ក. ការបំប៉នច្រាបថ្នាំ

➢ ក្រោយពីលើករងរួចគេដឹករណ្តៅជម្រៅពី ២០ទៅ៣០ស.ម

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ក្នុង១រណ្តៅត្រូវដាក់ដីកំប៉ុស្ត៍០.៥-១គ.ក្រ
- ហាលគ្រាប់ពូជរយៈពេល១ម៉ោងបន្ទាប់មកលាងទឹកសំអាតឲ្យស្អាតរួចត្រាំទឹករយៈពេលពី៤ទៅ៥ម៉ោង ហើយរុំគ្រាប់ពូជជាមួយនឹងក្រណាត់រួចហើយកប់ដីសើមរយៈពេលមួយយប់។
- អត្រាគ្រាប់ត្រសក់ដាំពី១ទៅ២គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅ រួចយកកំណាត់ចំបើងខ្លីៗឬដីធម្មជាតិពុកផុយរលួយល្អមករោយគ្របពីលើរណ្តៅ រួចហើយស្រោចទឹកភ្លាមដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជឆាប់ដុះលូតលាស់រហ័ស។
- គំលាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយកពី៣ទៅ៥តីករាងជាអក្សរវី(V) ចន្លោះជួរដើរយក៥តីក និងទ្រូងដំណាំយក៤ទៅ៥តីក។

ខ. ការបណ្តុះបណ្តាល

- ជាដំបូងគេត្រូវលាយល្បាយដីសំរាប់បណ្តុះគ្រាប់ពូជដោយប្រចល់ដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋដែលបានសំលាប់មេរោគរួចចំនួន៥០% (យកដីខ្សាច់មកគ្របដោយកៅស៊ូប្លាស្ទិកដោយដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល២ទៅ៣ថ្ងៃ)និងដីល្បាយដែលមានដីជាតិចំនួន៥០% រួចច្របល់ឲ្យសព្វល្អ ហើយច្រកចូលក្នុងថង់ប្លាស្ទិក កន្លែង ឬថ្នាល។
- ត្រូវចោះបាតថង់ប្លាស្ទិកឬកន្លែងនោះ ដើម្បីឲ្យជ្រាបទឹកចេញបានល្អ រួចយកគ្រាប់សាបតែម្តង។

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

គ. ការបំបែកយកូន

- របៀបដាំដូចទៅនឹងរបៀបដាំគ្រាប់ផ្ទាល់ខាងលើដែរ
- គេអាចដាំកូនត្រសក់នៅពេលដែលវាមានស្លឹក២ឬ៣សន្លឹក
- ត្រូវដាំនៅពេលល្ងាចត្រជាក់ល្អ
- បន្ទាប់ពីដាំហើយត្រូវយកកំទេចចំបើងស្នូតៗមករោយលើគល់

ដើម្បីរក្សាសំណើម។

២. ការថែទាំ

២.១. ការជ្រោយដី ពូនគល់ និងការកំចាត់ស្មៅ

ជម្រះស្មៅ ជ្រោយដី ពូនគល់ និងដករំលោះកូនមុនដាក់ដីបំប៉ន។
ត្រូវស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចជាប្រចាំរហូត
ដល់ពេលឈប់ប្រមូលផល។

២.២. ការថែទាំ

ប្រើដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតដោយក្នុងមួយរណ្តៅប្រើដីពី០.៥
គីឡូក្រាម ទៅ១គីឡូក្រាម។

២.៣. ការស្រោចស្រប់

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ត្រូវស្រោចទឹកជាប្រចាំនៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច
- ត្រូវរក្សាសំណើមពី ៦០ទៅ៧០% ប្រសិនបើមានសំណើមខ្ពស់
ពេកអាចកើតឡើងនូវពពួកជម្ងឺក្នុងដី។

២.៤. ការវាត់ចំណារ

❖ នៅពេលកូនត្រសក់ចាប់ផ្តើមបោះទង ក្រោយដាំរយៈពេលពី១០ ទៅ១៥ថ្ងៃយើងចាប់ផ្តើមចំណារដោយយកមែកឈើរូបកូនឬស្បៀមកដោតរួច ចងផ្គុំគ្នាតាមបណ្តោយរងដែលមានកំពស់ពី១.៥ទៅ២ម៉ែត្រ។

❖ ពេលត្រសក់បែកខ្លែងក្រោយដាំបាន២០ទៅ២៥ថ្ងៃ យើងត្រូវ ត្រួតពិនិត្យ និងដាក់ចំណារឲ្យត្រសក់ឡើងឱ្យបានល្អ។

៣. ការប្រមូលផលនិងការទុកវាត់គ្រាប់ពូជ

៣.១. ការប្រមូលផល

យើងអាចប្រមូលផលផ្លែត្រសក់ក្រោយពេលដាំដុះឬមានអាយុដូច ខាងក្រោម៖

- ✓ ពូជស្រាលអាយុ៣៥ទៅ៤០ថ្ងៃ
- ✓ ពូជកណ្តាលអាយុ ៤០ទៅ៥០ថ្ងៃ
- ✓ ពូជធ្ងន់អាយុ ៥០ទៅ៦០ថ្ងៃ

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

✓ ការប្រមូលផលត្រួសក់បើយឺតយ៉ាវបណ្តាលឲ្យផ្លែត្រួសក់ចាស់ គ្មានតម្លៃនៅលើទីផ្សារ។

៣.២. ការទុកដាក់គ្រាប់ពូជ

ត្រូវជ្រើសរើសផ្លែត្រួសក់ណាដែលធំ ទំលុ គ្មានជម្ងឺនិងគ្មានសត្វ ល្អិតបំផ្លាញ។ ក្រោយពីបេះវារួចត្រូវយកវាទុករយៈពេលពី៣ទៅ៥ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់របេះចេញពីសាច់ ទើបពុះច្របាច់លាងទឹកឲ្យស្អាត និង ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតល្អ រួចច្រកពូជក្នុងដបឬកែវ(ទុក១ភាគ៣នៃដប)គ្របឲ្យ ជិតទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព កន្លែងត្រជាក់និងមានខ្យល់ចេញ ចូលគ្រប់គ្រាន់។



រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)