

បេឡេនដំណាំស្ពៃខ្សែត



បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំស្ពៃខ្សែត

១. ការរៀបចំដី

☺ ជាដំបូងត្រូវភ្ជួរដីឬកាប់ដីហាលឱ្យបានរយៈពេលពី១០ថ្ងៃទៅ១៥ថ្ងៃ



☺ ត្រូវភ្ជួរប្រៃដីឱ្យបាន២ទៅ៣ដងថែមទៀតក្នុងជម្រៅដីពី២តឹកទៅ៣តឹក។

២. ការលើករង

❖ យើងធ្វើរងទទឹងយកប្រវែង១ម៉ែត្រវីងរងបណ្តោយតាមលទ្ធភាព។



❖ លើកកំពស់រងពី២០ទៅ២៥សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់រដូវប្រាំង។

❖ លើកកំពស់រងពី២៥ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ សម្រាប់រដូវវស្សា។

៣. ការដាំដុះ

❖ ជាដំបូងយកគ្រាប់ពូជស្ពៃមកហាលថ្ងៃរយៈពេលពី៣០ទៅ៤០នាទី។



❖ បន្ទាប់មកត្រូវយកគ្រាប់ស្ពៃមកត្រាំទឹករយៈពេលពី៣ទៅ៥ម៉ោងរួចហើយផ្តាច់វារយៈពេល១យប់ដោយបិទគំរូបឱ្យជិត។



❖ ត្រូវរៀបចំដីថ្នាលសម្រាប់សាបគ្រាប់ពូជឱ្យបានស្អាតល្អ។



❖ យកខ្សាច់៤ភាគមកច្របល់ជាមួយគ្រាប់ពូជស្ពៃឱ្យសព្វរួចហើយសាបឬព្រោះវានៅលើថ្នាលនោះឱ្យបានស្មើដៃល្អ។



❖ យកអំពុកចំបើង
 រោយទៅលើថ្នាល រួចហើយ
 ស្រោចទឹកពីលើវាភ្លាមៗ
 បន្ថែមពីនោះ យើងអាចធ្វើ
 ដំបូលគ្របពីលើផងដែរ។



❖ នៅពេលកូនស្ពៃដុះ
 បានអាយុ១៥ថ្ងៃ ឬឃើញ
 មានចេញសន្លឹក៣ទៅ៤
 សន្លឹក យើងអាចដកវាទៅ
 ស្ទង់បានហើយ។




❖ ត្រូវផ្អាក

ស្រោចទឹកកូនស្ពៃ
រយៈពេល១ថ្ងៃសិន
មុនពេលដកវាទៅ
ស្ទង់។



❖ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ត្រូវស្រោចទឹកកូនស្ពៃរួចហើយដកវាភ្លាម។

❖ ពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ
ត្រូវទុកគម្លាតពីគ្នាប្រវែងពី
១៥ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ (ជា
មធ្យម១៦ទៅ២០ដើមក្នុង១
ម៉ែត្រការ៉េ)។



❖ ចន្លោះរងប្រវែងដើរ
អាចទុកប្រវែងពី៣០ទៅ
៤០សង់ទីម៉ែត្រ (៣តឹក
ទៅ៤តឹក)។




របៀបបម្រុងទ្រព្យ

❖ សម្រាប់
ការព្រោះផ្ទាល់៖
បន្ទាប់ពីផ្តាច់
គ្រាប់ពូជស្តែ
ខៀវរួចមក ត្រូវ
យកវាទៅព្រោះ
នៅលើរងតែម្តង
រួចហើយរោយ



អំពុកចំបើងពីលើ បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវស្រោចទឹកវា៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ បើស្ថាន
ភាពដីមានសភាពស្ងួត។



❖ បើកូនស្តែដុះមកក្រាស់ពេក ត្រូវដក
វាចេញខ្លះឬដកវាយកទៅស្ទូងនៅកន្លែង
ដែលទំនេរ។



៤. ការថែទាំ

☒ ក្រោយពីស្ទង់បានរយៈពេល១០ថ្ងៃ ត្រូវបោចស្មៅ ជ្រុំជើង និងដាក់ដីបំប៉ន (ដីធម្មជាតិ)។



☒ មើលសត្វល្អិតជាប្រចាំ។

☒ ស្រោចទឹកស្អែកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។




☒ បើឃើញកូនស្ពៃណា ចាប់ផ្តើមពណ៌លឿង ស្រពោន ត្រូវដកវាចេញហើយយកទៅចោលឱ្យឆ្ងាយ ឬកប់ដីក៏បាន។



៥. ការប្រមូលផល

- ផ្អាកស្រោចទឹករយៈពេល១ថ្ងៃ មុនពេលប្រមូលផលស្ពៃ។
- នៅពេលស្ពៃមានអាយុ៤៥ទៅ ៥០ថ្ងៃយើងអាចប្រមូលផលបានចំពោះ ស្ពៃសាបគ្រាប់ផ្ទាល់។



- នៅពេលស្ពៃខៀវអាយុ បានពី៥០ទៅ៦០ថ្ងៃ យើងអាច ប្រមូលផលបានចំពោះស្ពៃស្លុង កូន។



- ទិន្នផលជាមធ្យម ទទួលបានពី១៦ទៅ១៨តោន សម្រាប់ផ្ទៃដីដាំ១ហិចតា។



🌸🌸🌸🌸🌸 **សូមអរគុណ** 🌸🌸🌸🌸🌸

មេរៀនដំណាំល្ពៅ



បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំល្ពៅ

១. ការជ្រើសរើសពូជ

- ☒ ពូជបង្កាត់: ជាពូជមានផ្លែច្រើន
- ☒ ពូជធម្មតា: ជាពូជអាចទុកដាំបន្តបាន
- ☒ ពូជដំណាំល្ពៅមានច្រើនប្រភេទដូច

ជាល្ពៅក្អែក ល្ពៅភ្នង ល្ពៅទ្រូឬល្ពៅហាប
។ល។



១. ល្ពៅក្អែក: វាជាល្ពៅដែលមានសំបកពណ៌ខ្មៅ

ហើយផ្លែរបស់វារាងតូចមូល ចំណែកឯសាច់វាក្រាស់
ហើយមានពណ៌លឿងចាស់។ បន្ថែមពីនោះល្ពៅក្អែក
មានគ្រាប់រាងមូលតូច។ ម៉្យាងវិញទៀតល្ពៅនេះត្រូវ
បានគេហៅថាល្ពៅភ្នំផងដែរ។ ពូជល្ពៅនេះវាធន់ទៅ
នឹងរដូវវស្សា។



២. ល្លៅភ្លុង: វាជាល្លៅដែលមានសំបកពណ៌
ប្រផេះមានផ្លែរាងតូច ទងធំ និងមានដើមតូច។
ពូជល្លៅនេះត្រូវបានគេដាំនៅលើតំបន់ដីខ្ពង់ទាបឬ
ដីទួល។



៣. ល្លៅទ្រូប្មល្លៅហាប: វាជាល្លៅ
ដែលមានស្លឹកធំ ដើមធំ និងទងវែង។ វិង
សាច់របស់វាមានពណ៌លឿងនិងមានជាតិ
ស៊ែរេច្រើន។ ពូជល្លៅនេះត្រូវបានគេដាំ
នៅតំបន់ដីទំនាប។



២. ការរៀបចំដី

☺ ភ្នំដីឬកាប់ដីហាលរយៈ
ពេលពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ។

☺ បន្ទាប់មកត្រូវភ្នំប្រែដីឱ្យ
បាន២ទៅ៣ដងទៀតរួចរាស់បំបែក
ដីឱ្យបានម៉ដ្ឋល្អ។



៣. ការរៀបចំរងប្តូរឈ្មោះ

❖ ការលើករងទទឹងគេអាចធ្វើបានចាប់ពី២ ទៅ៣ម៉ែត្រដោយគួរពូនតែម្តង រីឯបណ្តោយ រងតាមលទ្ធភាពដី។

❖ កំពស់រងអាចលើកចាប់ពី១៥ទៅ៣០ សង់ទីម៉ែត្រដោយទៅតាមរដូវកាលផងដែរ។



❖ ជាទូទៅដំណាំល្ពៅគេ កាប់រណ្តៅដាំ។

❖ នៅពេលវាដុះហើយទើប គេពូនរងតែម្តង។



៤. ការបំប៉ន

☑ ជាដំបូងត្រូវលាងសំអាត គ្រាប់ពូជាមុនសិន រួចយកវាទៅ ហាលថ្ងៃរយៈពេល៣ម៉ោង។




៣ ម៉ោង

☒ យកគ្រាប់ពូជមកខ្ទប់នឹងក្រណាត់ ហើយយកវាទៅត្រាំទឹករយៈពេលពី៤ ទៅ៥ម៉ោង រួចផ្តាប់រយៈពេល១យប់។



☒ កាប់រណ្តៅទំហំពី២ទៅ៣តឺក ក្នុងជម្រៅពី២ ទៅ៣តឺកដែរ។




☒ គម្លាតរណ្តៅពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ អាចទុកប្រវែងពី១២០សង់ទីម៉ែត្រទៅ ១៥០សង់ទីម៉ែត្រ។



សៀវភៅហត្ថកម្មសម្រាប់ដាំបន្លែ

☞ ទ្រូងដំណាំល្អ (ផ្លូវដើរ) អាចទុក ចន្លោះចាប់ពី២ទៅ៣ម៉ែត្រ។



☞ ត្រូវដាក់ដីធម្មជាតិឬដីកំប៉ុស្តិ៍ សម្រាប់ទ្រាប់បាតរណ្តៅផង

☞ ដាក់គ្រាប់ដាំចំនួន៣ទៅ៤ គ្រាប់សម្រាប់១រណ្តៅដោយកប់ ជម្រៅ៣សង់ទីម៉ែត្រ។

☞ ក្នុងផ្ទៃដី១ហិចតាគេដាំចំនួន ៤៥៦៥រណ្តៅស្មើនឹងចំនួនគ្រាប់ ៤,៥គីឡូក្រាម។



៥. ការជ្រោយដី

☞ ការជ្រោយដី ពូនគល់ បោច ស្មៅ គឺត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីដាំដុះ បានរយៈពេលពី១៥ទៅ២០ថ្ងៃ។



📖 ត្រូវពិនិត្យនិងដករំលោះកូនចោលខ្លះ បើមានកូនច្រើនពេក។



៦. ការថែទាំ

➢ ត្រូវពិនិត្យមើលសត្វ ល្អិត ឬជម្ងឺផ្សេងៗ។



➢ ត្រូវស្រោចទឹកដំណាំ ល្អៅឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាប់ពី ពេលដាំរហូតដល់ពេល ប្រមូលផល។



៧. ការប្រមូលផល

➢ ការប្រមូលផលវាអាស្រ័យទៅលើពូជ ពូជខ្លះចាប់ពីអាយុ៨០ទៅ៨៥ថ្ងៃ ពូជខ្លះទៀតចាប់ពីអាយុ៩៥ទៅ១១០ថ្ងៃ។



➢ យើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើតម្រូវការនៃទីផ្សារ។



៨. ការរក្សាពូជ

✓ យើងអាចរក្សាពូជល្អៗទុកដាំបន្តបានលុះត្រាតែពូជនោះមិនមែនជាពូជបង្កាត់។

✓ ត្រូវពិនិត្យយកផ្លែណាដែលទុំល្អ ហើយមិនមានស្នាមសត្វចោះ។



✓ ទុកផ្លែល្ពៅឱ្យទុំញោរ រួច
ទើបពុះយកគ្រាប់ បន្ទាប់មក
លាងទឹកវាឱ្យស្អាតល្អ។



✓ យក
គ្រាប់ដែល
លាងទឹករួច
នោះយកទៅ



ហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួត រួចហើយច្រកដាក់ក្នុងដប ក្នុងកែវ
ឬខ្ទប់នឹងក្រណាត់រក្សាទុកឱ្យបានល្អ។



 **សូមអរគុណ** 

បេឡេនដំណាំសណ្តែកក្រូច (សណ្តែកក្រូច)



១. សេចក្តីផ្តើម

សណ្តែកក្រូចគឺជាដំណាំឬជាបន្លែដែលកសិករនិយមដាំ និងនិយម បរិភោគពីព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងសម្បូរ ទៅដោយជីវជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់សរីរាង្គកាយ មានដូចជា ជាតិទឹក ប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ កាបូនអ៊ី ត្រាត និងកាលស្យូម។




២. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាសំខាន់ដំបូងសំរាប់ការដាំដុះកំណត់ទិន្នផលនិង តម្រូវការទីផ្សារ។ **កត្តាសំខាន់ៗដែល**

ត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសមានដូចជា៖

១. ពូជសុទ្ធល្អ
២. ពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់(ពូជក្នុងស្រុកឬពូជបង្កាត់)
៣. ពូជមានអាយុកាលត្រឹមត្រូវ
៤. ពូជដុះល្អពី ៨៥-៩០%
៥. ពូជធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងសត្វល្អិត និងធន់នឹងជម្ងឺ
៦. ចំពោះពូជបង្កាត់មិនអាចទុកពូជសម្រាប់ដាំបន្តបានទេ។



៣. បច្ចេកទេសដាំដុះ

៣.១ ការរៀបចំដី

១) កាប់ឬកូរដីហាលរយៈពេលពី ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់មក កូរ ប្រែវា ២ ទៅ ៣ ដង ទៀត

២) កាប់ដីឬកូរដីឲ្យបានជម្រៅពី ២០ ទៅ ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ រួចវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ ព្រមទាំងរើសយកស្មៅចេញឲ្យស្អាតផង។



៣.២ ការលើករង

១) ធ្វើរងទទឹងប្រវែង ០,៨ ម៉ែត្រ ទៅ ១ ម៉ែត្រ បណ្តោយតាមលទ្ធភាព។

២) កំពស់រងនៅរដូវប្រាំងពី ១៥ សង់ទីម៉ែត្រ ទៅ ២០ សង់ទីម៉ែត្រ

៣) កំពស់រងនៅរដូវវស្សាពី ២ សង់ទីម៉ែត្រ ទៅ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ។




៤) ពីរងមួយទៅរងមួយត្រូវទុកគម្លាតពីគ្នាប្រវែង ៣០សង់ទីម៉ែត្រ។



៥) ដាក់ជីកំប៉ុស្តិ៍ទំងន់០,៥គីឡូក្រាមទៅ១គីឡូក្រាមសម្រាប់ក្នុងមួយរណ្តៅហើយច្របល់វាឱ្យសព្វ រួចហើយកៀររាស់វាឱ្យបានស្មើល្អ។




៦) ជីករណ្តៅក្នុងជម្រៅពី១៥សង់ទីម៉ែត្រទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ ជាពីរជួរដែលមានចន្លោះគុម្ពពី ៤០ស.មទៅ៥០សង់ទីម៉ែត្រ និងចន្លោះជួរពី៦០សង់ទីម៉ែត្រទៅ៧០សង់ទីម៉ែត្រ។



៣.៣ របៀបដាំដុះ

ក-ការដាំគ្រាប់ពូជសណ្តែកកូរ

- ❖ យកគ្រាប់ពូជសណ្តែកកូរទៅហាលថ្ងៃរយៈពេលពី១ទៅ២ម៉ោងរួចយកវាទៅត្រាំទឹកស្អាតរយៈពេលពី៣ទៅ៤ម៉ោង។



- ❖ បន្ទាប់មកត្រូវផ្តាច់គ្រាប់ពូជរយៈពេល១យប់ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ដុះពន្លក។



- ❖ ដាក់ជីកំប៉ុស្តិ៍ដែលរលួយល្អចំនួន ០,៥គីឡូក្រាមក្នុង១រណ្តៅ។



- ❖ ដាក់គ្រាប់ពូជសណ្តែកកូរដាំក្នុង១រណ្តៅចំនួន២គ្រាប់ទៅ៣គ្រាប់កប់ដីក្នុងជម្រៅ៣សង់ទីម៉ែត្រ។



❖ រោយដីដែលមានជីជាតិ និងកំទេច
ចំបើងស្ងួតបន្តិចពីលើរណ្តៅរួចស្រោចទឹក
ឲ្យបានជោគល្អស្រោចវាព្រឹកល្ងាច។



❖ ក្រោយពីដាំបាន ១៥ ថ្ងៃ ត្រូវដក
កូនរំលួស (ជីវកូន) មើលដើមណាដែលអន់ត្រូវ
ដកចេញទុកតែដើមណាដែលល្អពី ២ ទៅ ៣
ដើមក្នុង ១ គុម្ពបានហើយ។



៧-ការបណ្តុះកូន

គេបណ្តុះកូនសណ្តែកឡើងដោយប្រើថង់ព្នានស្លឹកឬកន្ត្រែងស្លឹកចេកដែលមានច្រកដីពេញដោយប្រើល្បាយរួមមាន៖

- ដីកំប៉ុស្តិ៍ឬដីលាមកសត្វ៥០ភាគរយ
- ដីដំបូកឬដីមានដីជាតិ២៥%
- ដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋល្អ២៥%



- ដាក់គ្រាប់សណ្តែកក្នុងថង់ឬកន្ត្រែងចំនួន១ទៅ២គ្រាប់រួចស្រោចទឹកឲ្យជោគ (បាតថង់ឬកន្ត្រែងត្រូវជ្រាបទឹកបានល្អ) ។




- ក្រោយពីបណ្តុះបានពី៦ទៅ៧ថ្ងៃឬកូនសណ្តែកមានស្លឹកកំណើតពី២ទៅ៣សន្លឹកអាចយកវាទៅដាំបាន។



គ-ការដាំកូន

☞ ដីករណ្តៅជាពីរជួរដែលមានចន្លោះពីរណ្តៅមួយទៅរណ្តៅមួយទៀតគឺពី៤០សង់ទីម៉ែត្រទៅ៥០សង់ទីម៉ែត្រ និងចន្លោះជួរពី១ជួរទៅ១ជួរគឺ ពី៦០សង់ទីម៉ែត្រទៅ៧០សង់ទីម៉ែត្រ។



☞ ដាក់កូនសណ្តែកដាំ១ដើមទៅ២ដើមក្នុងមួយរណ្តៅ។



☞ ត្រូវយកកំទេចចំបើងខ្លីៗមកគ្របគល់សណ្តែកបន្ទាប់ពីដាំរួច ដើម្បីការពារសំណើមបន្ទាប់មកស្រោចទឹកវាភ្លាមឲ្យបានជោគជ័យ។



៤.ការថែទាំ

៤.១ ការកំចាត់ស្មៅជ្រោយដីនិងពូនរង

☞ **លើកទី១:** ធ្វើវាបន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេលពី១០ទៅ១២ថ្ងៃ។




១០ថ្ងៃ → ១២ថ្ងៃ

លើកទី២: ធ្វើវាក្រោយពេលជ្រោយដី លើកទី១បាន ១៥ថ្ងៃ ឬ សណ្តែកអាយុបាន ២៥ថ្ងៃ។



លើកទី៣: ធ្វើវានៅពេលសណ្តែក អាយុបាន៤០ថ្ងៃ គឺគ្រាន់តែកាត់ស្មៅត្រឹម ដីឬដកស្មៅទាំងឫសមិនចាំបាច់ជ្រោយ គល់ទៀតទេ។



៤.២ ការវាក់ដី


ការប្រើប្រាស់ដីទ្រាប់បាតគឺ ដាក់ដីកំប៉ុស្តិ៍ចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមទៅ ១គីឡូក្រាមក្នុង១រណ្តៅ ដោយ លាយច្របល់ឱ្យសព្វជាមួយដីនៅ ក្នុងរណ្តៅនោះ។



សៀវភៅហត្ថកម្មសម្រាប់ដាំបន្លែ

៤.៣ ការដោតចំណារប្រឡើងនិងការកាត់មែក

- យកកូនឈើនិងបូស្សីប្រវែងពី២ម៉ែត្រទៅ២,៥ម៉ែត្រមកធ្វើចំណារ។
- ដោតចំណារប្រឡើងមុខគ្នានៅពេលកូនសណ្តែកលូតលាស់បានពី៤ទៅ៥សន្លឹកដែលមានកំពស់ពី១៥សង់ទីម៉ែត្រទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ។



- ក្រោយពេលដាំបាន២០ទៅ២៥ថ្ងៃបូពេលសណ្តែកបែកខ្លែងត្រូវរុំខ្លែង និងដើមរបស់វាឬរុំជាប់ទៅនឹងចំណារក៏បាន។



- ត្រូវកាត់សំអាតមែកតូចៗចេញទុកតែមែកចំបងដោយធ្វើវានៅពេលសណ្តែកមានអាយុ២០ទៅ២៥ថ្ងៃ។




- កាត់ស្លឹកចាស់ៗដែលកើតជម្ងឺចោលដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជម្ងឺ និងកាត់បន្ថយជម្រកសត្វល្អិតហើយវាក៏អាចស្រូបយកជីវជាតិពីដីបានផងដែរ។



៤.៤ ការស្រោចទឹក

- សណ្តែកកូរត្រូវការទឹកជាប្រចាំតែមិនត្រូវការដក់ទឹកនៅក្នុងរងឬក្នុងចំការទេ
- យើងត្រូវស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។



- ចំពោះការបញ្ចូលទឹកត្រូវបញ្ចូល២ដងក្នុង១សប្តាហ៍ដោយយោងទៅតាមសភាពដី និងអាកាសធាតុ។



- ត្រូវត្រួតពិនិត្យដីថាតើមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ឬទេ ជាពិសេសនៅពេលសណ្តែកចាប់ផ្តើមចេញផ្កា(អាយុ៣០ថ្ងៃ) រហូតដល់ពេលប្រមូលផល។




៥. ការប្រមូលផល

❖ យើងអាចប្រមូលផលបាននៅពេលសណ្តែកមានអាយុចាប់ពី៦០ថ្ងៃទៅ៧៥ថ្ងៃដោយចាប់គិតពីពេលដាំ និងទៅតាមប្រភេទពូជផងដែរ។

❖ ការប្រមូលផលគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលរសៀល ហើយយើងអាចប្រមូលផលពី១៥ទៅ១៨ដងនៅក្នុងរដូវដាំសណ្តែកកូរ។



❖ គេមិនត្រូវក្តិតក្រោមទងស្នែងឬសន្តង់ទេ (លើសាច់សណ្តែកកូរ) ព្រោះធ្វើឲ្យសណ្តែករក្សាទុកមិនបានយូរឬឆាប់ហើមនិងមិនគួរកាត់ទាំងទងស្នែងឬសន្តង់ទេព្រោះធ្វើឲ្យទងស្នែងឬសន្តង់នោះលែងចេញផ្កាតទៅទៀត។



❖ បេះផ្លែថ្មមៗ ដាក់ក្រោមម្លប់ ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យបែកញើសហើយក្លាយទៅជាពណ៌លឿងនាំឲ្យឆាប់ខូច។



៦. ការអក្សាពូជទុក

➢ ហាមទុកពូជចំពោះផ្លែណាដែលនៅក្បែរដី ដែលនៅខ្ពស់ផុតពីដី កូរវែងល្អគ្មានជម្ងឺ និង គ្មានការបំផ្លាញពីពពួកសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗ។

➢ រើសយកកូរសណ្តែកដែលផ្លែសារទី២ ទៅ៤នៃដើមនិងជ្រើសយក២ទៅ៣កូរប៉ុណ្ណោះ ក្នុង១ដើមទុកវាឲ្យទុំស្អួតនៅលើដើមទើបយើង បេះវាមកហាលថ្ងៃឲ្យស្អួតល្អ។

➢ ញីបំបែកវាដើម្បីយកគ្រាប់ចេញ ហើយយកគ្រាប់នោះមកហាលថ្ងៃឲ្យស្អួតម្តង ទៀតរយៈពេលពី២ទៅ៣ថ្ងៃអត្រាសំណើមពី ១២ទៅ១៣ភាគរយ។

តែត្រូវទុកពូជចំពោះផ្លែណា



២ម៉ោង → ២ម៉ោង

➢ ច្រកគ្រាប់ពូជទាំងនោះចូលក្នុងដប(ទុក១ភាគ៣នៃដប) ឬក្នុងថង់ក្រណាត់ ហើយចងឬបិទឲ្យជិតរួចរក្សាទុក នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងមាន ខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់។



➢ រយៈពេលពី៣ឬ៤ខែត្រូវបញ្ចេញហាលថ្ងៃម្តង គឺរយៈពេលពី២ទៅ៣ម៉ោង ធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជមានសុខភាពល្អរក្សាដំណុះ បានយូរក្នុងករណីគ្រាប់នោះស្ងួតបានល្អ អត្រាសំណើមពី១២ទៅ១៣ភាគរយ។



ហាល២ម៉ោង → ៣ម៉ោងសម្រាប់៣ខែម្តង

 **សូមអរគុណ** 

ការចូលរួមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អ្នករៀបចំដើម្បីបង្កើតនិងកែសម្រួលសៀវភៅហត្ថកម្ម

- ❖ **លោក ភួន សាលី** នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ កសិកម្មបែបធម្មជាតិនិង រក្សាបរិស្ថានជនបទ ហៅកាត់ថា ស៊ី អារ ឌី ណាស់។
- ❖ **លោក យុក ស្រៀង** នាយករង របស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ កសិកម្មបែបធម្មជាតិនិង រក្សាបរិស្ថានជនបទ ហៅកាត់ថា ស៊ី អារ ឌី ណាស់។
- ❖ **លោកស្រី ស៊ុន សុគន្ធី** មន្ត្រីគម្រោង របស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ កសិកម្មបែបធម្មជាតិនិង រក្សាបរិស្ថានជនបទ ហៅកាត់ថា ស៊ី អារ ឌី ណាស់។

រូបថតសម្រាប់សៀវភៅនេះត្រូវបានសហការនិងជួយគាំទ្រដោយ

- ❖ គ្រួសារជនពិការដែលរស់នៅក្នុងភូមិដូចខាងក្រោម៖
 - គ្រួសារលោក **គីន ជេម** និងគ្រួសារលោក **ម៉ា សៀវម៉ុន** នៅភូមិតាសែន
 - គ្រួសារលោក **ពិទ្រ សារឿន** នៅភូមិស្វាយព្រៃ
 - លោក **ស៊ុន សន** នៅភូមិស្វាយ
 - គ្រួសារអ្នកស្រី **ហោ លេង**, លោក **ម៉េ សំណាង** និងលោក **សេង សាម៉េត** នៅភូមិអូរអន្លក់
 - គ្រួសារលោក **ហួន តិល** នៅភូមិ អូរដា
 - លោក **ទិល សាមិត** នៅភូមិកណ្តាល

- គ្រួសារលោក វិល ឡែន នៅភូមិកំរៀង
- គ្រួសារលោក ឯម ម៉ុង នៅភូមិស្រឡៅទង
- គ្រួសារលោក លាន ចាន់ណា នៅភូមិរកាបុស្ស

❖ អ្នកភូមិដែលទទួលផលពីអង្គការ ធារ៉ា រីនេសសាន់៖

- លោក អ៊ុន សាឡើត នៅភូមិរកាបុស្ស និង
- អ្នកស្រី ចឹក ហេង នៅភូមិរកាបុស្ស

❖ បុគ្គលិករបស់ អង្គការ ធារ៉ា រីនេសសាន់៖

- លោកស្រី យ៉ត យ៉ត
- លោកស្រី សំរិទ្ធី សាវ៉ាច និង
- លោក ខែ សាន់

ឯកសារយោង

📖 មេរៀនដំណាំបន្លែស្ពៃខៀវ និងបន្លែសណ្តែកកួរ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅបច្ចេកទេសដាំបន្លែជាលក្ខណៈគ្រួសារ (រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសាកលវិទ្យាល័យ និងដំណាំរួមផ្សំនិងកម្មវិធីវិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រងដំណាំជាតិ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣) និងដកស្រង់ចេញពី វិបសាយ: www.tssdcambodia.org

📖 មេរៀនដំណាំល្ពៅត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី មណ្ឌលព័ត៌មាននិងឯកសារ កសិកម្ម (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។