

បេឡេនដំណាំត្រកួនស



I. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការដាំត្រកួនស

ដំណាំត្រកួនសជាដំណាំងាយស្រួលដាំជាងគេបំផុត ក្នុងចំណោមដំណាំផ្សេងៗទៀត ហើយវាជាប្រភេទដំណាំឆ្លងកាត់។

អាយុកាលរបស់ដំណាំត្រកួនសចាប់តាំងពីពេលដាំ ឬសាបព្រោះរួចមកបានអាយុប្រហែលត្រឹមតែ ២២ទៅ២៥ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាចប្រមូលផលបាន អាចយកទៅធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ហូបឬសម្រាប់លក់ដូរ អាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃយ៉ាងងាយ។ ពូជដំណាំនេះ មិនរើសរដូវកាលដាំដុះឡើយ ។

ដំណាំត្រកួនសត្រូវការកំដៅសម្រាប់ទ្រទ្រង់សរីរាង្គរបស់វាចាប់ពី ៨០ ទៅ១០០ភាគរយ។ បន្ថែមពីនោះ វាត្រូវការទឹកនិងសំណើមត្រជាក់ជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ទើបធ្វើឱ្យវាល្អនិងឆាប់ទទួលបានផល។

II. គម្រោងដាំត្រកួនស

យើងត្រូវរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ដាំត្រកួនសដូចតទៅ៖

- ១- ជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ដាំដុះ ហើយកាប់គាស់ភ្នំរាស់ហាល ដីឲ្យបានល្អជាមុនប្រហែល១សប្តាហ៍

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

២- មានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់

៣- មានពូជ

៤- មានជីធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់

៥- មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធដូចជា ចប ឡាំង បង្គី កម្លាំងអូសទាញ។ល។

៦- ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ កម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ថែទាំនិងមានបច្ចេកទេស។

III. វិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រកូនស

យើងមានបច្ចេកទេសសម្រាប់ដាំត្រកូនសដូចខាងក្រោម៖

១- សង់រងសម្រាប់ដាំជាមុន បន្ទាប់ពីការកាប់គាស់ភ្នំរាស់រួចមក

២- លាយឬច្របល់ជីធម្មជាតិដាក់ក្នុងរង

៣- ឆ្លុតចង្កូរកាត់ទទឹងរងសម្រាប់ដាំ

៤- យកគ្រាប់ពូជមកខ្ទប់ជាមួយនឹងក្រណាត់ ហើយដាក់ត្រាំនៅ

ក្នុងទឹកធុងរយៈពេល១យប់។

៥- បន្ទាប់ពីត្រាំគ្រាប់ពូជ១យប់រួចមក យកគ្រាប់ពូជនោះមកដាំ

៦- ស្រោចទឹកនៅក្នុងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចព្រមទាំងថែទាំវាជាប្រចាំ។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

បញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់នៃការសង់រង៖ ក្បាលរងទំហំទទឹងស្មើ១ម៉ែត្រ បណ្តាយរងយកទំហំស្មើ៥ឬ១០ម៉ែត្រ កំពស់រឹងរងស្មើ១០សង់ទីម៉ែត្រ ទ្រូងរងនីមួយៗត្រូវចោលគម្លាតពីគ្នាស្មើ៤០សង់ទីម៉ែត្រ(៤តីករង្វាស់ខ្មែរ) (ពីរងមួយទៅរងមួយ) ។



រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

មេរៀនដំណាំសាឡាត់



បច្ចេកទេសនៃការដាំសាឡាត់

ក-ការរៀបចំដី

- ១) ភ្ជួរដីហាលចោលរយៈពេលពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
- ២) ត្រូវភ្ជួរប្រៃដីចំនួន២ឬ៣ដងដើម្បីឲ្យពពួកសត្វល្អិតចង្រៃស្លាប់ឲ្យស្មៅរលួយ ឲ្យដីមានជីជាតិ មានខ្យល់អុកស៊ីសែន និងធ្វើឲ្យដីធូនិងម៉ត់ល្អ។
- ៣) ភ្ជួរជម្រៅទៅក្នុងដី **ឲ្យបាន៣តឹក** ដើម្បីឲ្យដីមានសំណើមបានជ្រៅ និងធ្វើឱ្យដីធូ។

ខ-ការរៀបចំថ្នាលនិងរង

- ១) ថ្នាលត្រូវធ្វើទទឹង **១ម៉ែត្រឬ១,២ម៉ែត្រ** បណ្តោយថ្នាលយកតាមតម្រូវការ ចំណែកឯកំពស់ថ្នាលយកប្រវែងពី១០ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ ឬ២៥សង់ទីម៉ែត្រក៏បាន។
- ២) សំរាប់រងក៏ធ្វើដូចថ្នាលដែរតែបណ្តោយអាចវែង
- ៣) រងឬថ្នាលបណ្តោយ **២០ម៉ែត្រ** ត្រូវប្រើដីកំប៉ុស្តឬដីធម្មជាតិផ្សេងៗ **ចំនួន២០ទៅ២៥បង្កី**។

រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៤) ចន្លោះពីរងមួយទៅរងមួយឬចន្លោះផ្លូវដើរយកប្រវែងពី **៣ទៅ៤តឺក**

គ-ការដាំដុះ

១) ក្រោយពីធ្វើថ្នាលរួចហើយត្រូវយកដីធម្មជាតិឬកំប៉ុស្តទៅរោយពីលើរួចច្របល់នឹងដីថ្នាលឲ្យបានចូលគ្នាល្អផង។

២) យកគ្រាប់ពូជខ្ទប់នឹងក្រណាត់រួចត្រាំទឹក១យប់ផ្តាច់១យប់ (ពូជដែលនៅសល់ពីសាបត្រូវដាក់ក្នុងដបឬកំប៉ុស្តរួចបិទគំរបឲ្យជិតកុំឲ្យខ្យល់ចេញចូលរួច)

៣) យកពូជដែលផ្តាច់រួចនោះទៅរោយឬសាបពីលើថ្នាលដែលបានរៀបចំទុកកាលពីពេលមុន។

៤) ត្រូវយកកំទេចចំបើងឬអំពុកចំបើងទៅរោយពីលើបន្ទាប់ពីសាបគ្រាប់រួច ដើម្បីការពារដំណក់ទឹកនិងរក្សាសំណើមបានយូរ។

៥) ត្រូវធ្វើដំបូលការពារកំដៅថ្ងៃនិងទឹកភ្លៀងផង

៦) ក្រោយពីកូន **សាឡាត់ដុះបានរយៈពេលពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ** គេអាចដកវាយកទៅស្ទូងបានត្រូវជ្រើសកូនណាដែលល្អ **ត្រូវចាំ មុនពេលដកកូនទៅស្ទូង ត្រូវផ្អាកស្រោចទឹកនិងជីប៉ូរ៉េរយៈពេល២ថ្ងៃសិនទុកអោយដើមរឹងមាំ។**

៧) ត្រូវចាំពេលដាក់ដីកំប៉ុស្តនៅលើរងនោះត្រូវ **ទុករយៈពេលពី២ទៅ ៣ម៉ោង** សិនដើម្បីឲ្យដីអស់កំស្លុលកំដៅសិនចាំដាំវាបើដាំឬស្ទូងភ្លាមៗវាអាចភាយកំដៅនឹងធ្វើឲ្យកូនដំណាំរលួយបាន ព្រោះវានៅមានសារធាតុអាម៉ូញាក់។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៨) ការដាំត្រូវដាំគំលាតគ្នាពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែង១៥សង់ទីម៉ែត្រ និងត្រូវធ្វើដំបូលការពារកូនសន្លូងរយៈពេល២ឬ៣ថ្ងៃចាំបើកវា។

យ-ការថែទាំ

- ១) ស្រោចទឹកក្នុង១ថ្ងៃឲ្យបាន២ដងយ៉ាងតិចគឺព្រឹកនិងល្ងាច។
- ២) ក្រោយពីសាឡាត់ស្ងួតបានរយៈពេល៧ឬ៨ថ្ងៃ ត្រូវបោចស្មៅនិង ជ្រាយដីជ្រុំជើង កុំទុកឲ្យស្មៅវែងពេក។
- ៣) ត្រូវប្រើប្រាស់ដីបំប៉នធម្មជាតិពេលសាឡាត់អាយុបាន៨ថ្ងៃ ត្រូវ ស្រោច៣ថ្ងៃស្រោចម្តងនិងពេលសាឡាត់អាយុ១២ថ្ងៃត្រូវស្រោច១អាទិត្យម្តង។

ង-វិធីការពារ

១) ត្រូវដាំរុក្ខជាតិនៅក្បែរដើម្បីបន្ថាចសត្វចង្រៃដូចជា ស្លឹកគ្រៃ ផ្កា ស្បែរឿងឬប្រើថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលធ្វើពីធម្មជាតិ ទឹក១៧លីត្រនិងទឹក ថ្នាំធម្មជាតិ ១លីត្រសំរាប់បាញ់។

➢ ថ្នាំធម្មជាតិ ដូចជា បណ្តាលពេជ្រ គ្រាប់ស្លែង មើមក្នូច ផ្លែស្លាក់ ប្រង រំដេង ស្លឹកទាបបាយ។ល។ យកមកចិញ្ចាំឲ្យម៉ដ្ឋ រួចត្រាំទឹកផ្តាច់ទុករយៈ ពេល១ខែ តែត្រូវឧស្សាហ៍កូរវាឲ្យបានញឹកញាប់ បន្ទាប់មកអាចចម្រស់វា ដាក់ទុកក្នុងដបឬបីដុំហើយទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ល្អ។

រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- **ជីប៉ូរធម្មជាតិ** ចេកទំ៣kg ស្ករត្នោត១kg ត្រីសក់ស្រូវទំ៣kg ល្អុងទំ៣kg យកវាមកចិញ្ចាំឲ្យម៉ដ្ឋ រួចច្របល់ចូលគ្នារួចផ្តាច់ទុករយៈពេល១ខែ អាចចម្រស់វាមកប្រើបាន។
- **របៀបប្រើ** កូនដំណាំតូច ជី២ស្លាព្រាបាយនិងទឹក២០លីត្រ សំរាប់ដំណាំពីតូចដល់អាយុ២០ថ្ងៃ ត្រូវស្រោចក្នុង១ថ្ងៃ២ដង ត្រូវស្រោចពេលល្ងាច បើស្រោចពេលព្រឹកឬថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្រោចបានរយៈពេល១០នាទី ត្រូវស្រោចទឹកធម្មតាលាងស្លឹកវារិញ។ ជីប៉ូរនេះវាអាចទាក់ទាញសត្វមានប្រយោជន៍ដូចជាឃ្មុំ ឱម៉ាល់ និងស្រាំងជាដើម។

ច-ការប្រមូលផល

- ១) ពេលសាឡាត់មានអាយុបាន**៣០-៣៥ថ្ងៃ** គេចាប់ផ្តើម ប្រមូលផលបានហើយ (ពីសាបដល់ប្រមូលមាន៣៥ថ្ងៃ)។
- ២) មុនពេលដកប្រមូលផលត្រូវផ្អាកស្រោចទឹក១ថ្ងៃ
- ៣) ការដកត្រូវដកពេលព្រឹកឬល្ងាច តែពេលល្ងាចវាប្រសើរជាងពេលព្រឹក។
- ៤) របៀបប្រមូលត្រូវប្រើកូនចបដឹកឬកាំបិតច្រិបចាក់ឬសរួចចាប់ដកវារួចរលាស់ដីផង។
- ៥) ត្រូវដាក់វាក្នុងម្លប់រួចលាងទឹកគល់វាឲ្យបានស្អាត បន្ទាប់មកដាក់វាទៅក្នុងជាលដោយមានទ្រាប់ស្លឹកចេកដោយទុកចន្លោះឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលផង។

