

បេក្ខន្តិកាប្រឡងប្រចាំឆ្នាំ(ស)



បច្ចេកទេសនៃការបំពេញការងារ

១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីហាលដីរយៈពេលពី៧-១៥ថ្ងៃ
- ត្រូវភ្ជួរប្រើដីឱ្យបាន២ទៅ៣ដងក្នុងជម្រៅពី២ទៅ៣តីក។

២. ការរៀបចំរងប្រដាប់

- ☺ ធ្វើរងទទឹងយកប្រវែង១ម៉ែត្រ បណ្តោយតាមលទ្ធភាពដី
- ☺ ត្រូវលើកកំពស់រងពី១០-២៥ស.ម បណ្តោយរងប្រវែង១០ម៉ែត្រ
- ☺ ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយយកប្រវែងពី២,៥តីក-៣តីក
- ☺ ត្រូវប្រើដីធម្មជាតិឬដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតចំនួន២០-២៥បង្កី។

៣. ការដាំប្រដាប់

- ត្រូវធ្វើដីរងប្រដាប់ឱ្យបានស្អាតល្អ និងច្របល់ដីធម្មជាតិជាមួយដីរងឱ្យបានសព្វល្អ។

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- យកគ្រាប់ពូជផ្ទឹមកហាលថ្ងៃរយៈពេលពី៣០ទៅ៥០នាទី
- យកគ្រាប់ពូជត្រាំទឹករយៈពេលពី២ទៅ៣ម៉ោង រួចផ្តាច់១យប់
- យកខ្សាច់៤ភាគច្របល់ជាមួយគ្រាប់ពូជឱ្យបានសព្វល្អ បន្ទាប់មកយកវាទៅព្រោះលើថ្នាលស្តើងៗល្មម។
- រោយអំពុកចំបើង(បើមាន) រួចហើយស្រោចទឹកឱ្យជោគ។

ករណីមួយទៀត៖

- គ្រាប់ពូជមិនចាំបាច់ត្រាំទឹកទេ បន្ទាប់ពីហាលថ្ងៃរួចអាចយកវាទៅព្រោះបាន។
- គ្រាប់ពូជចាប់ផ្តើមដុះពន្លកក្រោយពីព្រោះបាន៣ទៅ៥ថ្ងៃ
- នៅពេលកូនផ្ទឹមដុះបានពី៧ទៅ១០ថ្ងៃ អាចដកយកទៅស្ទូងឬជួសបានឬកំពស់២ថ្នាំងដៃ ដោយចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែង១ទៅ២តីក ឬ២ទៅ៣តីក។

៤. ការថែទាំ

- ☺ ត្រូវស្រោចទឹកឱ្យបានសមស្រប កុំជោគជាំពេកបណ្តាលឱ្យរលួយ
- ☺ ត្រូវជ្រុំជើងឱ្យបានល្អ
- ☺ បោចស្មៅ មើលសត្វល្អិតនិងដាក់ដី។

៥. ការប្រមូលផល

- ការប្រមូលផលធ្វើឡើងនៅពេលដំណាំជឿអាយុបាន២៥ទៅ៣០ថ្ងៃ
- អាចដកទាំងឫស ឬកាត់ស្លឹកត្រួយ ការកាត់ត្រួយអាចប្រមូលបាន ច្រើនលើក វាអាស្រ័យតាមទីផ្សារ។

៦. ការរក្សាទុក

- ✓ ត្រូវទុកដើមឱ្យវាចេញផ្កាផ្លែ។ លុះផ្លែទុំល្មមហើយគេបូតវាដាក់ ចង ហើយហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួត។
- ✓ ញីឱ្យខ្ទេចរួចរោយយកគ្រាប់វារួចយកទៅហាលថ្ងៃម្តងទៀត រួច ច្រកដកទុកដាំដុះឆ្នាំក្រោយ។



រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

មេរៀនដំណាំសាឡាត់



បច្ចេកទេសនៃការដាំសាឡាត់

ក-ការរៀបចំដី

- ១) ភ្នំដីហាលចោលរយៈពេលពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
- ២) ត្រូវភ្នំប្រៃដីចំនួន២ឬ៣ដងដើម្បីឲ្យពពួកសត្វល្អិតចង្រៃស្លាប់ឲ្យស្មើរល្អយ ឲ្យដីមានជីជាតិ មានខ្យល់អុកស៊ីសែន និងធ្វើឲ្យដីធូនិងម៉ត់ល្អ។
- ៣) ភ្នំជម្រៅទៅក្នុងដីឲ្យបាន៣តឹកដើម្បីឲ្យដីមានសំណើមបានជ្រៅ និងធ្វើឱ្យដីធូ។

ខ-ការរៀបចំថ្នាលនិងរង

- ១) ថ្នាលត្រូវធ្វើទទឹង ១ម៉ែត្រឬ១,២ម៉ែត្រ បណ្តោយថ្នាលយកតាមតម្រូវការ ចំណែកឯកំពស់ថ្នាលយកប្រវែងពី១០ទៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ ឬ២៥សង់ទីម៉ែត្រក៏បាន។
- ២) សំរាប់រងក៏ធ្វើដូចថ្នាលដែរតែបណ្តោយអាចវែង

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៣) រងឬថ្នាលបណ្តោយ **២០ម៉ែត្រ** ត្រូវប្រើដីកំប៉ុស្តឬដីធម្មជាតិផ្សេងៗ **ចំនួន២០ទៅ២៥បង្កី**។

៤) ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយឬចន្លោះផ្លូវដើរយកប្រវែងពី **៣ទៅ៤តីក**

គ-ការដាំដុះ

១) ក្រោយពីធ្វើថ្នាលរួចហើយត្រូវយកដីធម្មជាតិឬកំប៉ុស្តទៅរោយពី លើរួចច្របល់នឹងដីថ្នាលឲ្យបានចូលគ្នាល្អផង។

២) យកគ្រាប់ពូជខ្ទប់នឹងក្រណាត់រួចត្រាំទឹក១យប់ផ្តាច់១យប់ *(ពូជដែលនៅសល់ពីសាបត្រូវដាក់ក្នុងដបឬកំប៉ុស្តរួចបិទគំរប់ឲ្យជិតកុំឲ្យ ខ្យល់ចេញចូលរួច)*

៣) យកពូជដែលផ្តាច់រួចនោះទៅរោយឬសាបពីលើថ្នាលដែលបាន រៀបចំទុកកាលពីពេលមុន។

៤) ត្រូវយកកំទេចចំបើងឬអំពុកចំបើងទៅរោយពីលើបន្ទាប់ពីសាប គ្រាប់រួច ដើម្បីការពារដំណក់ទឹកនិងរក្សាសំណើមបានយូរ។

៥) ត្រូវធ្វើដំបូលការពារកំដៅថ្ងៃនិងទឹកភ្លៀងផង

៦) ក្រោយពីកូន **សាឡាត់ដុះបានរយៈពេលពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ**គេអាច ដកវាយកទៅស្ទូងបានត្រូវជ្រើសកូនណាដែលល្អ **ត្រូវចាំ មុនពេលដកកូនទៅ ស្ទូងត្រូវផ្អាកស្រោចទឹកនិងដីប៉ុន្តែរយៈពេល២ថ្ងៃសិនទុកអោយដើមរឹងមាំ**។

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារីឌីណាស់ (CRDNASE)

៧) ត្រូវចាំពេលដាក់ដឹកប៉ុស្តិ៍នៅលើរងនោះត្រូវទុករយៈពេលពី២ទៅ ៣ម៉ោងសិនដើម្បីឲ្យដីអស់កំស្លុលកំដៅសិនចាំដាំវាបើដាំឬស្នូងភ្លាមៗវា អាចភាយកំដៅនឹងធ្វើឲ្យកូនដំណាំរលួយបាន ព្រោះវានៅមានសារធាតុ អាម៉ូញាក់។

៨) ការដាំត្រូវដាំគំលាតគ្នាពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែង១៥សង់ទីម៉ែត្រ និងត្រូវធ្វើដំបូលការពារកូនសន្ទូងរយៈពេល២ឬ៣ថ្ងៃចាំបើកវា។

យ-ការថែទាំ

- ១) ស្រោចទឹកក្នុង១ថ្ងៃឲ្យបាន២ដងយ៉ាងតិចគឺព្រឹកនិងល្ងាច។
- ២) ក្រោយពីសាឡាត់ស្ទូងបានរយៈពេល៧ឬ៨ថ្ងៃ ត្រូវបោចស្មៅនិង ជ្រាយដីជ្រុំជើង កុំទុកឲ្យស្មៅវែងពេក។
- ៣) ត្រូវប្រើប្រាស់ដីបំប៉នធម្មជាតិពេលសាឡាត់អាយុបាន៨ថ្ងៃ ត្រូវ ស្រោច៣ថ្ងៃស្រោចម្តងនិងពេលសាឡាត់អាយុ១២ថ្ងៃត្រូវស្រោច១អាទិត្យម្តង។

ង-វិធីការពារ

១) ត្រូវដាំរុក្ខជាតិនៅក្បែរដើម្បីបន្ថាចសត្វចង្រៃដូចជា ស្លឹកគ្រៃ ផ្កា ស្បែររឿងឬប្រើថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលធ្វើពីធម្មជាតិ ទឹក១៧លីត្រនិងទឹក ថ្នាំធម្មជាតិ ១លីត្រសំរាប់បាញ់។

➢ ថ្នាំធម្មជាតិ ដូចជា បណ្តុលពេជ្រ គ្រាប់ស្លែង មើមកូច ផ្លែស្លាក់ ប្រង់ រំដេង ស្លឹកទាបបាយ។ល។ យកមកចិញ្ចាំឲ្យម៉ដ្ឋ រួចត្រាំទឹកផ្តាច់ទុករយៈ

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

ពេល១ខែ តែត្រូវឧស្សាហ៍កូរវាឲ្យបានញឹកញាប់ បន្ទាប់មកអាចចម្រស់វា ដាក់ទុកក្នុងដបឬបីដុំហើយទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ល្អ។

➢ **ជីប៉ូរធម្មជាតិ** ចេកទំ៣kg ស្ករត្នោត១kg ត្រសក់ស្រូវទំ៣kg ល្អុងទំ ៣kg យកវាមកចិញ្ចាំឲ្យម៉ដ្ឋ រួចច្របល់ចូលគ្នារួចផ្តាច់ទុករយៈពេល១ខែ អាចចម្រស់វាមកប្រើបាន។

➢ **របៀបប្រើ** កូនដំណាំតូច ជី២ស្លាព្រាបាយនិងទឹក២០លីត្រ សំរាប់ ដំណាំពីតូចដល់អាយុ២០ថ្ងៃ ត្រូវស្រោចក្នុង១ថ្ងៃ២ដង ត្រូវស្រោចពេល ល្ងាច បើស្រោចពេលព្រឹកឬថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្រោចបានរយៈពេល១០នាទី ត្រូវ ស្រោចទឹកធម្មតាលាងស្លឹកវាវិញ។ ជីប៉ូរនេះវាអាចទាក់ទាញសត្វមាន ប្រយោជន៍ដូចជាឃ្មុំ ឱម៉ាល់ និងស្រាំងជាដើម។

ច-ការប្រមូលផល

- ១) ពេលសាឡាត់មានអាយុបាន **៣០-៣៥ថ្ងៃ** គេចាប់ផ្តើម ប្រមូល ផលបានហើយ (ពីសាបដល់ប្រមូលមាន៣៥ថ្ងៃ)។
- ២) មុនពេលដកប្រមូលផលត្រូវផ្អាកស្រោចទឹក១ថ្ងៃ
- ៣) ការដកត្រូវដកពេលព្រឹកឬល្ងាច តែពេលល្ងាចវាប្រសើរជាងពេលព្រឹក។
- ៤) របៀបប្រមូលត្រូវប្រើកូនចបដឹកឬកាំបិតច្រិបចាក់ឬសរួចចាប់ដក វារួចរលាស់ដីផង។

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារីឌីណាស់ (CRDNASE)

៥) ត្រូវដាក់វាក្នុងម្លប់រួចលាងទឹកគល់វាឲ្យបានស្អាត បន្ទាប់មកដាក់វាទៅក្នុងជាលដោយមានទ្រាប់ស្លឹកចេកដោយទុកចន្លោះឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលផង។



រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)