

# បេក្ខជនដំណាំស្ពៃចង្កឹះ



## បច្ចេកទេសនៃការដាំស្ពៃចង្កឹះ

### ១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីហាលដីរយៈពេលពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
- ត្រូវភ្ជួរប្រៃដីឱ្យបាន២ទៅ៣ដងក្នុងជម្រៅពី២ទៅ៣តីក។

### ២. ការរៀបចំថ្នាលប្រុង

- ☺ ធ្វើរងទទឹងយកប្រវែង១ម៉ែត្រ បណ្តោយតាមលទ្ធភាពដី
- ☺ ត្រូវលើកកំពស់រងពី១៥ទៅ២០ស.ម នៅក្នុងរដូវប្រាំង រីឯរដូវវស្សាត្រូវលើករងកំពស់ពី២០ស.ម ទៅ៣០ស.ម។
- ☺ ត្រូវធ្វើដីឱ្យម៉ដ្ឋល្អនិងហាលវារយៈពេលបីថ្ងៃ មុនយកគ្រាប់ពូជទៅសាបលើថ្នាល។

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

**៣. ការវាយប្រហែល:**

- ប្រើជីធម្មជាតិពី១ទៅ២បង្កើនសម្រាប់ដាក់ទ្រាប់បាតរង ហើយ ច្របល់ជីនោះជាមួយដីរងឱ្យបានសព្វល្អ។
- យកគ្រាប់ស្ពៃចង្កឹះទៅហាលថ្ងៃរយៈពេល៣០នាទី ហើយយកវា ទៅត្រាំទឹករយៈពេល៣ម៉ោង បន្ទាប់មកផ្កាប់វានៅក្នុងធុងទឹកកករយៈពេល ១យប់។
- យកដីខ្សាច់៤ភាគច្របល់ជាមួយគ្រាប់ពូជស្ពៃ បន្ទាប់មកយកវា ទៅសាមលើថ្នាល។
- នៅពេលកូនស្ពៃអាយុបានពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ យើងអាចយកវាទៅ ស្ទង់បាន(២០ស.ម គុណនឹង ២០ស.ម)។

**+ ការវាយប្រហែលដោយផ្ទាល់:**

- ត្រូវសាបគ្រាប់ពូជរង្វាល់ល្មមបន្ទាប់ពីត្រាំទឹករួច
- រោយកំទេចចំបើងពីលើរង
- ស្រោចទឹកវាឱ្យបានជោគបន្ទាប់ពីរោយកំទេចចំបើង
- មុនសាបគ្រាប់ពូជត្រូវស្រោចទឹករងឱ្យបានជោគជាមុនសិន។

### ៤. ការថែទាំ

- ត្រូវជ្រោយដី
- ដកស្មៅ
- ស្រោចទឹកស្អែកឆ្អឹងឱ្យបានជោគល្អនិង
- ត្រូវមើលសត្វល្អិតជាប្រចាំ។

### ៤. ការប្រមូលផល

- ✓ នៅពេលស្អែកឆ្អឹងអាយុបានពី២០ទៅ២៥ថ្ងៃ យើងអាចប្រមូលផលបានហើយ។
- ✓ ស្អែកឆ្អឹងត្រូវបានគេប្រមូលផលនៅក្នុងពេលព្រឹកនៅម៉ោង៧ទៅម៉ោង១០ព្រឹក និងនៅពេលរសៀលនៅម៉ោង៣ទៅម៉ោង៦។
- ✓ ត្រូវបញ្ឈប់ការស្រោចទឹករយៈពេល២ថ្ងៃមុនពេលប្រមូលផល
- ✓ ការប្រមូលផលស្អែកឆ្អឹងគឺយោងទៅលើតម្រូវការទីផ្សារផងដែរ។



# បេក្ខជនដំណាំត្រឡាច



## បច្ចេកទេសនៃការដាំស្លែចង្កឹះ

### ១. ការជ្រើសរើសពូជ

ពូជត្រឡាចមានច្រើនប្រភេទដូចជា៖

- ត្រឡាចពូជស្រាល
- ត្រឡាចពូជកណ្តាលនិង
- ត្រឡាចពូជធ្ងន់។

### ២. ការរៀបចំដី

- កាប់ឬកូរដីហាលរយៈពេលពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
- បន្ទាប់មកត្រូវកូរប្រេដីឱ្យបាន២ទៅ៣ដងទៀតក្នុងជម្រៅពី២តឹកទៅ៣តឹក។

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៣. ការរៀបចំរង

❖ រងទទឹងអាចត្រូវបានគេភ្ជួរលើករង រងទទឹងស្មើ២ទៅ៣ម៉ែត្រឬ៧ តឹក។ ប្រសិនបើប្រវែង៧តឹក ត្រូវទុកចន្លោះរងស្មើ២ទៅ៣ម៉ែត្រ។

❖ កំពស់រង= ១៥ទៅ ២០ស.ម និង២០ទៅ៣០ស.ម ដោយ អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដី។

❖ ត្រូវកាប់ជារណ្តៅនៅចំកណ្តាលរងបណ្តោយ រណ្តៅមានទំហំ២ តឹក៤ជ្រុងដោយទុកគម្លាតពីគ្នា១២០ទៅ១៥០ស.ម ឬពី៨០ស.មទៅ ១០០ស.ម។

### + ករណីសម្រាប់ដីមានជីជាតិក្នុងរដូវប្រាំង៖

គេ(កសិករ)គ្រាន់តែភ្ជួរដីឱ្យបានច្រើនដងសារចុះសារឡើង បន្ទាប់មកកាប់រណ្តៅ រួចហើយដាក់ដាំត្រឡាចតែម្តង។

### ៤. ការដាំបុះ

▣ ត្រូវលាងសម្អាតគ្រាប់ពូជ ហើយបន្ទាប់មកទៀតយកវាទៅហាល ថ្ងៃរយៈពេលពី២ទៅ៣ម៉ោង។

▣ យកគ្រាប់ពូជដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល១យប់និងផ្តាច់វារយៈពេល១ យប់ដែរ បន្ទាប់មកយកវាទៅដាំ។ ត្រូវយកដីកំប៉ុស្តិ៍ដាក់ក្នុងរណ្តៅហើយ

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

ច្របល់ជាមួយដីនៅក្នុងរណ្តៅឱ្យបានសព្វល្អ ក្រោយមកទៀតកាយលុបដី  
បំពេញរណ្តៅ។

- ដាក់គ្រាប់ដាំ៣ទៅ៤គ្រាប់សម្រាប់មួយរណ្តៅ
- ស្រោចទឹកឱ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីដាំរួច
- ត្រឡាចអាចដាក់ឱ្យវារនៅលើដីឬធ្វើទ្រើងឱ្យវារក៏បាន។

**+ ចំណាំ៖**

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឱ្យត្រឡាចមានផ្លែច្រើន លោកអ្នកត្រូវ  
តែកាត់ទងរបស់វាម្តងនៅពេលវាលូតលាស់បាន៧ថ្ងៃ។ នៅពេលខ្លួន  
ត្រឡាចលូតបាន៧ថ្ងៃ ត្រូវកាត់ត្រួយវាចេញម្តងទៀត។ នៅពេលខ្លួន  
ដែលត្រូវកាត់ចេញនោះលូតបាន៧ថ្ងៃទៀតត្រូវកាត់ត្រួយរបស់វាចេញ  
ម្តងទៀត។ លោកអ្នកធ្វើដូចនេះ វានឹងធ្វើឱ្យត្រឡាចរបស់លោកអ្នកមានផ្លែ  
ច្រើនជាក់ជាមិនខានឡើយ។

**៥. ការថែទាំ**

- ត្រូវពិនិត្យមើលកូនត្រឡាចនៅពេលវាលូតលាស់បានអាយុពី៧  
ទៅ១៥ថ្ងៃ អាចដកកូនត្រឡាចចេញខ្លះ(បើមានច្រើនដើម)។
- បោចស្មៅ
- ជ្រុំជើងត្រឡាច

---

រៀបចំដោយលោក យុក សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ដាក់ដីបំប៉ននិង
- ស្រោចទឹកត្រឡាចឱ្យបានជោគល្អ។

### ៥. ការប្រមូលផល

- ✓ ត្រឡាចអាចប្រមូលផលបានចាប់ពី៤០ថ្ងៃទៅ៥០ថ្ងៃសម្រាប់ត្រឡាចពូជស្រាល។
- ✓ ការប្រមូលផលគឺអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការទីផ្សារផងដែរ។

