

# មេរៀនដំណាំសណ្តែកក្រូច (សណ្តែកក្រូច)



សណ្តែកក្រូចគឺជាដំណាំប្រជាប្រិយដែលកសិករនិយមដាំ និង និយមបរិភោគពីព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងសម្បូរជីវជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់ សរីរាង្គកាយ មានដូចជា ជាតិទឹក ប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់កាបូនអ៊ីត្រាតនិង កាល ស្យូម។

## ១. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាសំខាន់ដំបូងសំរាប់ការដាំដុះកំណត់ទិន្ន ផល និងតម្រូវការទីផ្សារ។

**កត្តាសំខាន់ៗដែលត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសមានដូចជា៖**

- ពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់ (ពូជក្នុងស្រុកឬពូជបង្កាត់)
- ពូជមានអាយុកាលត្រឹមត្រូវ
- ពូជដុះល្អពី៨៥-៩០%
- ពូជសុទ្ធល្អ
- ពូជធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងសត្វល្អិត និងធន់នឹងជម្ងឺ។

ចំពោះពូជបង្កាត់មិនអាចទុកពូជសម្រាប់ដាំបន្តបានទេ។

---

រៀបចំដោយលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

## ២.បច្ចេកទេសជាមុន

### ២.១ ការរៀបចំដី

- កាប់ឬក្នួរដីរួចហាលដីរយៈពេលពី៧-១៥ថ្ងៃ បន្ទាប់មកក្នួរប្រែវា ២-៣ដងទៀត។
- កាប់ឬក្នួរដីឲ្យបានជម្រៅពី២០-២៥ស.ម រួចវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ រើសយកស្មៅចេញឲ្យស្អាត។

### ២.២ ការលើករង

- ធ្វើរងទទឹងប្រវែង០,៨-១ម៉ែត្រ បណ្តោយតាមលទ្ធភាព
- កំពស់រងនៅរដូវប្រាំង ពី១៥-២០ស.ម
- កំពស់រងនៅរដូវវស្សា ពី២០-៣០ស.ម
- ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយប្រវែង ៣០ ស.ម
- ដាក់ដីកំប៉ុស្តិ៍ទំងន់០,៥-១គីឡូក្រាមក្នុងមួយរណ្តៅហើយច្របល់ ឱ្យសព្វ រួចកៀរ រាស់វាឲ្យបានស្មើល្អ។
- ជីករណ្តៅជម្រៅពី១៥-២០ ស.ម ជាពីរជួរដែលមានចន្លោះគុម្ពពី ៤០-៥០ស.ម និងចន្លោះជួរ ពី៦០-៧០ស.ម។

---

រៀបចំដោយលោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

## ២.៣ របៀបវារៈ

### ក-ការវាស់វែងដោយផ្ទាល់

- យកគ្រាប់ពូជទៅហាលថ្ងៃរយៈពេលពី១-២ម៉ោងរួចយកវាទៅត្រាំទឹកស្អាតរយៈពេលពី៣-៤ម៉ោង
- ត្រូវផ្តាច់គ្រាប់ពូជរយៈពេល១យប់ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ងាយដុះពន្លក
- ដាក់ដីកំប៉ុស្តិ៍ដែលរលួយល្អចំនួន០,៥គីឡូក្រាមក្នុង១រណ្តៅ
- ដាក់គ្រាប់សណ្តែកដាំក្នុង១រណ្តៅចំនួន២-៣គ្រាប់ជម្រៅ៣ស.ម
- រោយដីមានជីជាតិ និងកំទេចចំបើងស្អាតបន្តិចពីលើរណ្តៅ រួចស្រោចទឹកឲ្យបានជោគល្អ(ស្រោចព្រឹកល្ងាច)
- ក្រោយពីដាំបាន១៥ថ្ងៃត្រូវដកកូនរំលូស(ជីវកូន)ដើមណាដែលអន់ដកចេញទុកដើមណាដែលល្អ២-៣ដើមក្នុង១គុម្ព។

### ខ-ការបណ្តុះកូន

គេបណ្តុះកូនសណ្តែកឡើងដោយប្រើថង់ប្លាស្ទិកឬកន្ត្រែងស្លឹកចេកដែលមានច្រកដីពេញដោយប្រើល្បាយរួមមាន៖

- ដីកំប៉ុស្តិ៍ឬដីលាមកសត្វ៥០ភាគរយ
- ដីដំបូកឬដីមានជីជាតិ២៥%

---

រៀបចំដោយលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ដីខ្សាច់មីដ្ឋល្អ២៥%
- ដាក់គ្រាប់សណ្តែកក្នុងថង់ឬកន្លែងចំនួន១-២គ្រាប់រួចស្រោចទឹកឲ្យជោគ(បាតថង់ឬកន្លែងត្រូវជ្រាបទឹកបានល្អ)
- ក្រោយបណ្តុះបានពី៦-៧ថ្ងៃឬកូនសណ្តែកមានស្លឹកកំណើត២-៣សន្លឹកអាចយកវាទៅដាំបាន។

**គ-ការថែទាំ**

- ដឹករណ្តៅជាពីរជួរដែលមានចន្លោះរណ្តៅពី៤០-៥០ស.ម និងចន្លោះជួរពី៦០-៧០ស.ម
- ដាក់កូនសណ្តែកដាំ១-២ដើមក្នុងមួយរណ្តៅ
- ត្រូវយកកំទេចចំបើងខ្លីៗមកគ្របគល់សណ្តែកបន្ទាប់ពីដាំរួចភ្លាមដើម្បីការពារសំណើមរួចស្រោចទឹកភ្លាមឲ្យបានជោគល្អ។

**៣. ការថែទាំ**

**៣.១ ការកំចាត់ស្មៅជ្រោយមីនិងពូនរង**

📖 **លើកទី១:** ធ្វើវាបន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេលពី១០-១២ថ្ងៃ

📖 **លើកទី២:** ធ្វើវាក្រោយពេលជ្រោយដីលើកទី១បាន ១៥ថ្ងៃ ឬសណ្តែកអាយុបាន២៥ថ្ងៃ។

---

រៀបចំដោយលោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

**📖 លើកទី៣:** ធ្វើវានៅពេលសណ្តែកអាយុបាន៤០ថ្ងៃ គឺគ្រាន់តែ កាត់ស្មៅត្រឹមដីឬដកស្មៅទាំងឫសមិនចាំបាច់ជ្រោយគល់ទេ។

**៣.២ ការដាក់ដី**

ការប្រើដីទ្រាប់បាតគឺដាក់ដីកំប៉ុស្តិ៍ចំនួន០,៥-១គីឡូក្រាម ក្នុង ១រណ្តៅដោយលាយច្របល់ជាមួយដីនៅក្នុងរណ្តៅ ។

**៣.៣ ការដេតចំណារឬជ្រែងនិងការកាត់មែក**

- ☺ យកកូនឈើនិងឫស្សីប្រវែងពី២-២,៥ម៉ែត្រមកធ្វើចំណារ
- ☺ ដោតប្រឈមមុខគ្នានៅពេលកូនសណ្តែកលូតលាស់បាន៤-៥ សន្លឹក ដែលមានកំពស់១៥-២០ស.ម
- ☺ ក្រោយពេលដាំបាន២០-២៥ថ្ងៃឬពេលសណ្តែកបែកខ្លែងត្រូវរុំ ខ្លែង នឹងដើមរបស់វាឬរុំជាប់ទៅនឹងចំណារ
- ☺ ត្រូវកាត់សំអាតមែកតូចៗចេញទុកតែមែកចំបងហើយធ្វើវានៅ ពេលសណ្តែកមានអាយុ២០-២៥ថ្ងៃ
- ☺ កាត់ស្លឹកចាស់ៗដែលកើតជម្ងឺចោលដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជម្ងឺ កាត់បន្ថយជម្រកសត្វល្អិតនិងអាចស្រូបយកជីវជាតិតីដី។

**៣.៤ ការស្រោចទឹក**

---

រៀបចំដោយលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

☺ សណ្តែកកូរត្រូវការទឹកជាប្រចាំតែមិនត្រូវការដក់ទឹកនៅក្នុងរង្ស  
ក្នុងចំការទេ

☺ យើងត្រូវស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេលព្រឹកនិងល្ងាច

☺ ចំពោះការបញ្ចូលទឹកត្រូវបញ្ចូល២ដងក្នុង១សប្តាហ៍ទៅតាម  
សភាពដី និងអាកាសធាតុ

☺ ត្រូវត្រួតពិនិត្យដីថាតើមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ឬទេ ជាពិសេសនៅ  
ពេលសណ្តែកចាប់ផ្តើមចេញផ្កា(អាយុ៣០ថ្ងៃ) រហូតដល់ពេលប្រមូលផល។

**៤. ការប្រមូលផល**

☺ យើងអាចប្រមូលផលបាននៅពេលសណ្តែកមានអាយុពី៦០-  
៧៥ថ្ងៃ ដោយចាប់គិតពីពេលដាំនិងទៅតាមប្រភេទពូជផងដែរ

☺ ការប្រមូលផលត្រូវធ្វើនៅពេលរសៀល

☺ គេមិនត្រូវក្តិចក្រោមទងស្នែងឬសន្តង់ទេ (លើសាច់សណ្តែកកូរ)  
ព្រោះធ្វើឲ្យសណ្តែករក្សាទុកមិនបានយូរឬឆាប់ហើមនិងមិនគួរកាត់ទាំងទង  
ស្នែងឬសន្តង់ទេព្រោះធ្វើឲ្យទងស្នែងឬសន្តង់នោះលែងចេញផ្កាតទៅទៀត។

☺ បេះផ្លែថ្មមៗ ដាក់ក្រោមម្លប់ ព្រោះវាអាចបែកញើសទៅជាពណ៌  
លឿងនាំឲ្យឆាប់ខូច

☺ យើងអាចប្រមូលផលបានចាប់ពី១៥-១៨លើកក្នុងមួយរដូវដាំដុះ។

---

រៀបចំដោយលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៥. ការរក្សាពូជទុក

- ហាមទុកពូជចំពោះផ្លែណាដែលនៅក្បែរដី តែត្រូវទុកពូជចំពោះផ្លែណាដែលនៅខ្ពស់ផុតពីដី ក្នុងវែងល្អគ្មានជម្ងឺ និងគ្មានការបំផ្លាញពីពពួកសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗ
- រើសយកកូរសណ្តែកដែលផ្លែសារទី២-៤នៃដើម និងជ្រើសយក ២-៣កូរសណ្តែកក្នុង១ដើម ទុកវាឲ្យទុំស្ងួតនៅលើដើមទើបយើងបេះវាមកហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតល្អ
- ញីបំបែកវាដើម្បីយកគ្រាប់ចេញ ហើយយកគ្រាប់នោះមកហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតម្តងទៀតរយៈពេល២-៣ថ្ងៃ
- ច្រកគ្រាប់ពូជទាំងនោះចូលក្នុងដប(ទុក១ភាគ៣នៃដប) ឬក្នុងចងក្រណាត់ហើយចងឬបិទឲ្យជិតរួចរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់
- រយៈពេល៣ឬ៤ខែត្រូវបញ្ចេញហាលថ្ងៃម្តង គឺរយៈពេល២-៣ម៉ោងធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជមានសុខភាពល្អរក្សាដំណុះបានយូរក្នុងករណីគ្រាប់នោះស្ងួតបានល្អអត្រាសំណើមពី១២-១៣ភាគរយ។



# បេក្ខន៍ដំណាំស្បែកឆ្មើ



## ១. បច្ចេកទេសនៃការដាំស្បែកឆ្មើ

### ១.១-ការរៀបចំដី

- ត្រូវភ្ជួររាស់ដីហាលចោលចាប់ពី៧-១៥ថ្ងៃភ្ជួរដីជម្រៅពី១៥-៣០ស.ម
- ភ្ជួរប្រែវាឡើងវិញឲ្យបាន២-៣ដងដើម្បីត្រឡប់ស្មៅឬរុក្ខជាតិផ្សេងៗ ឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោមនឹងឲ្យវារលួយទៅជាដី សម្លាប់ដង្កូវដឹកខ្សឿ និងសត្វល្អិតដែលមាននៅក្នុងដី ហើយម៉្យាងទៀតធ្វើឲ្យដីជួរនិងមានខ្យល់អុកស៊ីសែនចេញចូលបានល្អ។

### ១.២-ការលើករង

- ធ្វើរងទទឹង ១ម៉ែត្រ បណ្តោយ១០ម៉ែត្រ ឬតាមលទ្ធភាព
- ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយ ៣៥-៥០ស.ម គម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយកប្រវែង២តឺក (ទទឹងរង១ម៉ែត្រអាចដាំបានចំនួន ៣-៤ជួរ)។
- រដូវវស្សាអាចលើករងកំពស់២០-៣០ស.ម រាងខ្នងអណ្តើកឬខ្ពស់ជាងនេះទៅតាមស្ថានភាពដី។
- រដូវប្រាំងអាចលើករងកំពស់១៥-២០ស.ម រាងផតកណ្តាល។

---

រៀបចំដោយលោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)



- ដាក់ដីធម្មជាតិឬដីកំប៉ុស្តិ៍សំរាប់ទ្រាប់បាតពី១០-១៥គីឡូក្រាម រួច ច្របល់ជាមួយដីរងនោះអោយសព្វ។

**១.៣-ការដាំដុះ**

**ក- ការសាបគ្រាប់**

- យកគ្រាប់មកហាលថ្ងៃរយៈពេល២០-៣០នាទី រួចយកវាទៅត្រាំ ទឹករយៈពេល៣ម៉ោង បន្ទាប់មកផ្តាប់វា១យប់ដើម្បីឲ្យគ្រាប់វារីក។
- ធ្វើថ្នាលឲ្យបានល្អ ដីម៉ត់ល្អ រួចយកគ្រាប់ស្តែមកលាយជាមួយដីខ្សាច់ ៤ភាគរួចច្របល់ឲ្យស្មើសាច់រួចយកវាទៅរោយលើថ្នាលឲ្យរង្វើលៗល្មម។
- យកផេះបាចជុំវិញថ្នាល ដើម្បីការពារសត្វស្រមោចពាំ។
- មួយបែបទៀត គឺពេលធ្វើរងរួចហើយ យកគ្រាប់ដែលត្រាំនឹងផ្តាប់រួច នោះទៅព្រោះពីលើរង បន្ទាប់មករោយកំទេចចំបើងពីលើរួចស្រោចទឹកជា ការស្រេច។

**ខ- ការដកស្ទូង**

- ការស្ទូងត្រូវធ្វើនៅពេលកូនស្តែមានអាយុពី១០-១៥ថ្ងៃ ឬពេលវា មានសន្លឹក៣ឬ៤។
- ផ្អាកស្រោចទឹករយៈពេល២ថ្ងៃ មុនពេលដកកូនទៅដាំដើម្បីធ្វើឲ្យ កូនស្តែធន់ទៅនឹងកំដៅថ្ងៃ។

---

រៀបចំដោយលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- មុននឹងដកត្រូវស្រោចទឹកលើថ្នាលកូនស្តែឲ្យបានសើមល្អ ដើម្បី ងាយស្រួលក្នុងការដកកូនយកទៅស្ទូង។
- ត្រូវដកកូនបន្ទាប់ពីស្រោចទឹកភ្លាម។
- ស្ទូងចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយកប្រវែង២០ស.ម និងចន្លោះរង ៣៥-៥០ស.ម។
- ត្រូវគ្របកូនសន្ទូង២-៣ថ្ងៃដើម្បីការពារកំដៅថ្ងៃ។
- បើភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំខ្លាំងក្នុងរង ត្រូវបង្ហូរទឹកចេញ។
- ត្រូវបង្កើនបរិមាណទឹកស្រោចចាប់ពីពេលស្ទូងរហូតដល់ពេល ប្រមូលផល។

## ២. ការថែទាំ

### ២.១- ការកំចាត់ស្មៅនិងជ្រោយដី

- ការសំអាតស្មៅគឺធ្វើឡើងដោយដៃ ដោយចប ចបជីក ចបកាប់ និងបន្ទះឬស្សីសំរាប់ជ្រោយដី។ វិធីនេះងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តនៅជុំវិញ រងនិងចន្លោះរង។
- ការជម្រះស្មៅនិងជ្រោយដីត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលកូនស្តែស្ទូងបាន ១០ថ្ងៃ ហើយធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន កុំឲ្យប៉ះពាល់ឬស ជាហេតុនាំឲ្យអន់ឬ ងាប់កូនស្តែ។

---

រៀបចំដោយលោក យុគ សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ការប្រមូលផលអាចប្រើកូនកាំបិទសំរាប់កាត់គល់។
- 

### ២.២-ការស្រោចស្រប់

- ស្រោចទឹក១ថ្ងៃ២ដងនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច
- នៅរដូវវស្សាបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយ គេក៏ត្រូវស្រោចទឹកដើម្បីលាងសំអាតកំទេចដីដែលមានជាប់ឬនៅបណ្តាលស្មៅជាហេតុធ្វើឲ្យរលួយ។

### ២.៣-ការដាក់ដី

យើងប្រើដីកំប៉ុស្ត៍ពី០,៥-១គីឡូក្រាមលើផ្ទៃដី១ម៉ែត្រការ៉េ ដោយច្របល់ឲ្យសព្វរួចហើយស្រោចទឹកឲ្យជោគ។

### ៣.ការប្រមូលផល

- ការប្រមូលផលធ្វើឡើងតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាគេអាចដកទាំងឫសឬកាត់យកតែដើមក៏បាន វាអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ។
- មុននឹងកាត់ឬដកស្ពៃមិនត្រូវស្រោចទឹកឡើយដោយទុកឲ្យស្លឹកស្ពៃស្ងួតការពារជាប់កិត។
- ស្ពៃអាចប្រមូលផលបាននៅអាយុ៣០-៤០ថ្ងៃ ចំពោះស្ពៃសាបដោយផ្ទាល់និងនៅអាយុ៤០-៥០ថ្ងៃចំពោះស្ពៃដែលដកកូនទៅស្ទូង។

---

រៀបចំដោយលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- គេអាចប្រមូលពេលព្រឹកឬល្ងាច ហើយទុកវាដាក់ក្នុងម្លប់ និងដាក់  
វាក្នុងល្អិត កញ្ជ្រប កេះដោយទ្រាប់ស្លឹកចេកផង។
- ទិន្នផលជាមធ្យមចន្លោះពី១៦-១៨តោនក្នុង១ហិកតាតែវាក៏  
អាស្រ័យលើការដាំដុះ ការថែទាំ និងប្រភេទពូជផងដែរ។

