

បេឡេនដំណាំស្ពៃលើដី



១. បច្ចេកទេសនៃការដាំស្ពៃលើដី

១.១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីហាលដីរយៈពេលពី៧-១០ថ្ងៃ (កុំដាំស្ពៃនៅលើដីដែលមានទឹកលិចនៅរដូវវស្សា)
- បន្ទាប់ពីនោះត្រូវប្រែដីយ៉ាងហោចណាស់២ទៅ៣ដងទៀត។

១.២. ការលើករង

☺ ការលើករងទទឹងយកប្រវែង១ម៉ែត្រ បណ្តោយយកប្រវែង១០ម៉ែត្រឬអាស្រ័យតាមលទ្ធភាព នៅចន្លោះពីរងមួយទៅរងមួយត្រូវទុកចន្លោះពី២៥-៣០សង់ទីម៉ែត្រ។

☺ នៅរដូវវស្សាត្រូវលើករងកំពស់ពី២០-២៥ស.ម រាងខ្នងអណ្តើក។

☺ នៅរដូវប្រាំងត្រូវលើករងកំពស់ពី១០-១៥សង់ទីម៉ែត្រហើយរាង

ផតកណ្តាល។

រៀបចំដោយលោកភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និងលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

☺ ត្រូវដាក់ដីធម្មជាតិឬដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតចំនួន៥-១០

គីឡូក្រាមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ ហើយច្របល់វាឱ្យសព្វល្អជាមួយដីនៅក្នុងរង។

១.៣. ការវាវុះ

- យកគ្រាប់ស្ពៃជើងទាមកហាលរយៈពេល៣០នាទី។
- យកគ្រាប់ស្ពៃនោះមកត្រាំទឹករយៈពេល៣ម៉ោង បន្ទាប់មកផ្តាច់ វារយៈពេល១យប់ដើម្បីធ្វើឱ្យគ្រាប់ឆាប់រីក។

📖 វិធីសាស្ត្រទី១៖

- រៀបចំថ្នាលឱ្យបានល្អ បន្ទាប់មកច្របល់គ្រាប់ស្ពៃជាមួយដីខ្សាច់ (ឧទាហរណ៍: គ្រាប់ស្ពៃ០,១គីឡូក្រាមលាយជាមួយខ្សាច់០,៤គីឡូក្រាម)។
- រោយគ្រាប់ស្ពៃទៅក្នុងរងហើយស្រោចទឹកវាឱ្យជោគ ត្រូវស្រោច ទឹកវា៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេលព្រឹក ពេលថ្ងៃ និងពេលល្ងាច។
- ត្រូវបាចផេះជុំវិញរងដើម្បីការពារសត្វស្រមោចពាំគ្រាប់។
- ពេលកូនស្ពៃអាយុបាន១៥-២០ថ្ងៃយើងអាចដកកូនទៅស្ទូងបាន
- មុនដកកូនស្ពៃយកទៅស្ទូងត្រូវផ្អាកស្រោចទឹករយៈពេល២ថ្ងៃ។
- ស្រោចទឹកវាឱ្យជោគ បន្ទាប់មកដកវាពីរងភ្លាម។
- ត្រូវដកកូនស្ពៃណាដែលល្អហើយមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

រៀបចំដោយលោកក្នុង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង
 លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ស្នូងក្នុងចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយគឺប្រវែង១៥-២០ស.ម
ហើយក្នុងចន្លោះរងពីមួយទៅមួយគឺប្រវែង២៥-៣០ស.ម។
- ត្រូវគ្របកូនស្តែដែលស្នូងរួចរយៈពេលពី២-៣ថ្ងៃដើម្បីការពារកំដៅ
- ស្រោចទឹកស្តែនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចរហូតដល់ពេល
ប្រមូលផល។

📖 វិធីសាស្ត្រទី២៖

- ធ្វើរងឱ្យបានល្អបន្ទាប់មកយកគ្រាប់ស្តែដែលបានផ្តាច់រួចមក
លាយជាមួយដីខ្សាច់៤ភាគហើយច្របល់ឱ្យសព្វ។
- ព្រោះគ្រាប់ស្តែក្នុងថ្នាលរួចហើយស្រោចទឹកវា ឬធ្វើជាចង្កូរ ដោយ
យកទទឹងរងដូចរងត្រកូនដែរ។ គម្លាតចង្កូរគឺប្រវែងពី១៥-២០ស.ម បន្ទាប់
មកយកគ្រាប់ស្តែរោយទៅក្នុងចង្កូររួចស្រោចទឹកវា។

២. ការថែទាំ

- ☺ ត្រូវស្រោចទឹក១ថ្ងៃ២ដងគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។
- ☺ បោចស្មៅនិងដាក់ដី។
- ☺ ឃ្នាំមើលសត្វល្អិតជាប្រចាំ។

រៀបចំដោយលោកក្នុង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង
លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៣. ការប្រមូលផល

✓ នៅពេលស្តែអាម៉ូញបាន៤៥-៥០ថ្ងៃ យើងអាចប្រមូលផលបាន ចំពោះស្តែដែលគេសាបកូនដោយផ្ទាល់។ រីឯស្តែដែលគេដកកូនស្ទឹងគឺ មានអាយុពី៥០-៦០ថ្ងៃ ទើបអាចប្រមូលផលបាន។

✓ ទិន្នផលដែលយើងទទួលបានពី១៦-១៨តោនក្នុង១ហិកតា ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យលើការថែទាំនិងគ្រាប់ពូជស្តែផងដែរ។



រៀបចំដោយលោកក្នុង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង
លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

បេឡេនដំណាំត្រកូនស



១. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការដាំត្រកូនស

ដំណាំត្រកូនគឺជាដំណាំដែលងាយស្រួលដាំជាងគេបំផុតហើយវាជាប្រភេទដំណាំឆ្លងកាត់ផងដែរ។

នៅពេលដំណាំត្រកូនមានអាយុបានប្រហែលជា២២-២៥ថ្ងៃយើងអាចប្រមូលផលបានដោយចាប់រាប់ពីថ្ងៃដាំដំបូងឬសាបដំបូង។ បន្ថែមពីនោះ យើងក៏អាចយកដំណាំនេះមកធ្វើជាបន្លែសម្រាប់បរិភោគជាញឹកញាប់ឬសម្រាប់លក់ដូរក៏បានហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងងាយ។ ចំណុចពិសេសមួយទៀតដំណាំត្រកូន ដាំមិនរើសរដូវកាលឡើយ។

ដំណាំត្រកូននេះត្រូវការកំដៅពី៨០-១០០ភាគរយដើម្បីទ្រទ្រង់ដើមរបស់វា ហើយវាក៏ត្រូវការទឹកនិងសំណើមត្រជាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ បន្ទាប់មកវានឹងធ្វើឱ្យដំណាំនេះឆាប់លូតលាស់បានល្អនិងឆាប់ទទួលផល។

២. គម្រោងនៃការដាំត្រកូនស

ដើម្បីដាំត្រកូនសយើងត្រូវមានគម្រោងដាំដូចខាងក្រោម៖

រៀបចំដោយលោកក្នុង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និងលោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ១. ជាដំបូងត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ដាំ
- ២. កាប់ ឬកូររាស់ដីនិងហាលដីប្រហែល១សប្តាហ៍
- ៣. មានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ៤. មានគ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំ
- ៥. មានដីធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ៦. មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធដូចជា ចបកាប់ ចបដឹក ឡាំងស្រោច បង្គំ និងកម្លាំងអូសទាញ។ល។
- ៧. ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺកម្លាំងសម្រាប់ថែទាំនិងបច្ចេកទេស។

៣. បច្ចេកទេសនៃការដាំត្រកូនស

ដើម្បីដាំត្រកូនសយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសដាំដូចខាងក្រោម៖

- ១. ជាដំបូង លើករងដាំបន្ទាប់ពីកាប់ឬកូររាស់ដី
- ២. ច្របល់ដីធម្មជាតិជាមួយនឹងដីរងឱ្យបានសព្វ
- ៣. ធ្វើចង្កូរកាត់ជួរទទឹងរង
- ៤. ខ្ទប់គ្រាប់ពូជជាមួយក្រណាត់ហើយត្រាំទឹកផងរយៈពេល១យប់
- ៥. បន្ទាប់ពីត្រាំទឹក១យប់ យកគ្រាប់ពូជនោះទៅដាំ
- ៦. ស្រោចទឹក១ថ្ងៃ២ដងគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច
- ៧. ត្រូវថែទាំវាជាប្រចាំ។

រៀបចំដោយលោកក្នុង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE) និង
 លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

📖 ចំណាំសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ៗនៃទំហំរងត្រកូត

- ទទឹងរងយកប្រវែង១ម៉ែត្រ
- បណ្តោយរងយកប្រវែង៥ទៅ១០ម៉ែត្រ
- កំពស់រងយកប្រវែង១០សង់ទីម៉ែត្រ
- ទ្រូងរងនីមួយៗ(ផ្លូវដើរ) នៅចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយយកប្រវែង ៤០សង់ទីម៉ែត្រ ឬ៤តីក។



រៀបចំដោយលោកក្នុង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)និង
 លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)